

# 結核病的認識與治療注意事項

## 症狀：



午後輕度發燒  
夜間寒顫及盜汗



體重減輕



咳嗽 2 週以上



胸痛、胸悶  
咳痰、咳血

## 確診方法：

- ✚ 胸部 X 光檢查
- ✚ 驗痰液檢查

## 治療期間的注意事項：

- 每月至少複診一次，定期測肝功能、腎功能、尿酸、視力檢查，評估有無副作用發生
- **不可擅自停藥**，需持續服藥治療至少 **6~9 個月**
- 傳染性的病人，配合服藥至少治療 14 天後或治療到痰檢驗為陰性時，才可去工作，治療期間應配帶 N95 口罩



配帶 N95 口罩



檢查配帶正確方式

## 居家注意事項：

- 注重個人衛生、打噴嚏、咳嗽應以紙遮住口鼻，避免飛沫噴出，有痰應吐於衛生紙包覆。
- 保持室內**空氣流通**，棉被、床單、枕頭，應經常曝曬於陽光至少4~6小時。
- 出入公共場所或人潮擁擠處，應配戴口罩。
- 結核病密切接觸者需配合「七分篩檢法」進行自我健康管理。

## 七分篩檢法：

下列症狀達到5分以上建議盡快至醫院胸腔科或感染科就醫做進一步檢查



結核病不可怕早期診斷、配合治療，獲得健康並保護家人