



## 各類管路護理

管路名稱	注意事項
鼻胃管	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.注意鼻胃管的刻度，保持管路通暢勿牽扯、勿扭曲。</li> <li>2.觀察引流物的量、顏色、味道、性質。</li> <li>3.固定的膠布需每天更換。</li> </ol>
導尿管	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.尿袋需低於腰部以下，以免尿液逆流造成感染。</li> <li>2.尿管勿扭結、勿牽扯。</li> <li>3.觀察尿液的量、顏色、味道、有無沉澱物等。</li> <li>4.每天需做尿管護理並更換固定部位。</li> </ol>
氣切造口	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.注意氣切有無滑脫。</li> <li>2.每天以無菌技術換藥，以優碘棉枝由內往外消毒氣切傷口，再以生理食鹽水棉枝由內往外消毒氣切傷口。</li> <li>3.造口周圍以 Y 紗圍繞，觀察傷口是否有紅腫、異常分泌物、出血等情形。</li> </ol>
氣管內管	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.注意氣管內管有無滑脫。</li> <li>2.每班隨時查看氣管內管固定的深度並紀錄。</li> <li>3.每天更換膠帶並將氣管內管移至另一側，以避免長時間持續壓迫同側，造成壓瘡。</li> </ol>
H/V 或 V/B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.保持管子通暢，勿牽扯、勿扭曲。</li> <li>2.注意引流量、顏色、性質。</li> </ol>
pig-tail	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.每天以無菌技術換藥。</li> <li>2.注意固定深度。</li> <li>3.保持管子通暢，勿牽扯、勿扭曲。</li> <li>4.注意引流量、顏色、性質。</li> </ol>
T 型 引流管	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.每天以無菌技術換藥。</li> <li>2.不要固定在床欄以免牽扯。</li> <li>3.引流袋要低於總膽管以免感染。</li> <li>4.觀察引流液的量、顏色、性質。</li> </ol>
胸腔 引流管	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.每天以無菌技術換藥，引流瓶需保持低於胸部 60 公分。</li> <li>2.注意引流量、顏色及性質。</li> <li>3.鼓勵深呼吸及咳嗽，以利肺部擴張。</li> <li>4.注意引流管保持通暢及連接處是否有漏氣情形。</li> </ol>
中央 靜脈導管	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.每三天換一次藥，如有滲液則需隨時更換。</li> <li>2.注意有無紅、腫、熱、痛感染等症狀。</li> </ol>

健仁醫院護理部教育組 97.02.03 修訂