



## 人類免疫缺乏病毒篩檢注意事項

### 一、人類免疫缺乏病毒（HIV）的傳染途徑：

#### （一）性行為傳染：

任何無保護性（未全程正確使用保險套）之口腔、肛門、陰道等方式之性交，均有可能感染。

#### （二）血液交換傳染：

1. 共用注射針頭、針筒或稀釋液。
2. 使用或接觸被愛滋病毒污染的血液、血液製劑，如：輸血、針扎等。
3. 接受愛滋病毒感染者之器官移植。

#### （三）母子垂直感染：

嬰兒被已感染病毒的母親在妊娠期、生產過程或因授乳而感染。

### 二、本項人類免疫缺乏病毒抗體篩檢，需三天可知檢驗結果，篩檢結果與相關注意事項如下：

#### （一）篩檢呈陰性反應：

1. 為了保護您與他人的健康，建議您仍需採取預防措施，如進行性行為時須全程使用保險套，避免透過以上途徑傳播人類免疫缺乏病毒。
2. 可能處於空窗期，無法完全排除感染，建議您 3 個月及 6 個月後再進行篩檢一次，期間並請避免捐血或發生危險性行為。

#### （二）篩檢呈陽性反應：

1. 篩檢呈陽性反應仍不能確認為人類免疫缺乏病毒感染，須再以西方墨點法確認試驗。
2. 確認檢驗結果為陽性，須至愛滋病指定醫院（請詳見疾病管制局全球資訊網 [www.cdc.gov.tw](http://www.cdc.gov.tw)）進行後續照護及治療，愛滋病免費諮詢電話：0800-888995 或疾病管制局諮詢專線：1922。
3. 確認試驗結果為陰性或未確定時，有鑒於可能處於空窗期，應於 3 個月後再自行至合格檢驗單位篩檢。
4. 目前台灣提供高效能抗病毒藥物治療（俗稱雞尾酒治療），治療後均能有效延長生命 10~20 年以上且大幅提升生活品質，只要您遵循醫囑，定期追蹤與治療不必太過憂心。

### 三、本院篩檢是具名保密檢驗，對於您的檢驗結果及個人隱私，均會妥善保護並負保密之責。篩檢結果若為陽性，將進行西方墨點確認檢驗，西方墨點確認檢驗呈陽性，視為 HIV 感染者，依法通報地方衛生機關，以提供後續就醫轉介服務。

### 四、行政院衛生署疾病管制局合約提供人類免疫缺乏病毒匿名篩檢醫院： 大高雄地區：高醫附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、義大醫院。