




Jalan endotrakeal tube Perawatan

氣管內管管路照護-印尼文

bohong		kewaspadaan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan bahwa saluran yang benar menghubungkan alat 2. Hidung buatan ditambah serpentine tube stopkontak untuk menyisahkan tentang bedrail 80 sampai 90 cm (tidak tinggal terlalu pendek untuk menghindari tabung endotrakeal selip)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. tabung serpentine adalah tetap ke rel tempat tidur, hindari jalur memutar. 2. Pasang memperbaiki kaset setiap hari untuk menghindari selip. 3. Tangan bijaksana dan tepat kendala pasien.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lengan Serpentine tetap untuk pasien di babak kedua terikat pada akar tidur pagar. 2. Tabung Serpentine tidak bisa terlalu dekat dengan tangan pasien (pergelangan tangan dan siku kiri pipa minimal 20 cm atau lebih)
berdiri		kewaspadaan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Executive berdiri, mengambil spons mandi, atau ketika bergerak pasien harus melonggarkan setelah baris mengular pipa berdiri. 2. Pelaksanaan pengasuh tangan untuk memegang tabung serpentine, hindari menyentuh tangan pasien atau ditarik ke dalam pipa, dan untuk menghindari trakeostomi pergeseran stoma atau tergelincir.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah menyalakan pasien kembali bantal pad, jalur berkelok-kelok letakkan kembali dan melihat penempatan benar. 2. Tabung Serpentine tidak bisa terlalu dekat dengan tangan pasien (pergelangan tangan dan siku kiri pipa minimal 20 cm atau lebih)