

# 暫時性透析導管的照護

## 一、何謂暫時性導管？

- 1.需緊急接受血液透析，但沒有合適瘻管或瘻管尚未成熟的病人，通常放置於頸部或大腿鼠蹊部。
- 2.置放時間約 2~4 週，一旦建立的瘻管成熟時，則需儘速拔除，如導管須延後使用，需與醫療團隊討論評估處理方式，以避免增加感染機率。

## 二、自我照護注意事項：

- 1.避免阻塞：執行日常活動時，勿壓迫導管，如 D/S 放置於腹股溝時，應避免大於 90 度坐姿放腹股溝處則應減少彎曲大腿的機會。
- 2.避免滑動、脫落：勿著緊身套頭衣物以防造成拉扯，若不慎導管滑出，可立即自行壓迫傷口止血，並儘速就醫。
- 3.避免傷口（導管入口處）感染：傷口避免沾水，洗頭採平躺方式，並以塑膠布覆蓋傷口，勿淋浴或泡澡，應採擦澡方式。若導管位於股靜脈，應保持會陰部乾淨。
- 4.導管傷口有紅、腫、熱、痛、滲出液（血）、發冷、發熱及縫線脫落應立即告知護理人員。
- 5.除非緊急狀況，否則應避免導管做洗腎以外的治療。
- 6.請隨時注意導管夾子是否夾緊，勿自行固定開關避出血。
- 7.尖銳物品，如安全別針。

## 三、透析期間：

- 1.導管置入鼠蹊部時，為避免肢體屈曲壓迫導管，針對躁動、意識不清或無法配合的病人，必要時予以約束。