

Standardized Mite Extract Mixture(D.f. and D.p.)

藥品學名	Standardized Mite Extract Mixture(D.f. and D.p.)
商品名	英文：Standardized Mite Extract Mixture(D.f. and D.p.) · 中文：蟎過敏治療注射劑
劑型含量	D.f. 5000AU/ml, D.p. 5000AU/ml 共 10000AU/ml, 10ml/vial 稀釋濃度：1000AU/ml、100AU/ml、10AU/ml
廠牌	Greer Laboratories
許可證字號	無(專案進口藥物)
藥理作用	治療塵蟎過敏症
適應症	治療塵蟎引起的過敏性氣喘、鼻炎及結膜炎
用法用量	注射：五歲以上兒童及成人皮下注射。初始劑量：10 AU/ml 0.05 ml · 經每週一次增量 50-100% 治療數次維持劑量：500-2000 AU 每週-每月一次。 舌下：10 AU/ml · 每日一次，睡前將使用劑量直接滴入舌下。
肝腎功能劑量調整	無資料
懷孕分級	C
藥物動力學	無資料
禁忌	出血性疾病、對塵蟎極度敏感、自體免疫疾病、心肌梗塞、腎病症候群兒童、有慢性肺炎、FEV1<50%、有任何會降低系統性副作用發作存活率之疾病。
注意事項	1.須先進行蟎過敏原皮膚試驗並確定為第一型蟎過敏後才可以開始免疫治療。 2.打針後要留在醫院觀察 20-30 分是否發生任何反應。 3.出現下列狀況應暫時停藥或向下調整劑量：嚴重鼻炎及/或氣喘症狀、感染或流行性感冒合併發燒、暴露於過量臨床相關的過敏原、出現局部或全身性反應。 4.抗組織胺會抑制即刻皮膚試驗。 5.平均療程為 3-5 年。
副作用	全身性皮膚紅斑、蕁麻疹、喉水腫、低血壓、喘息
健保類別	自費使用。
自費價	150 元/次
藥品儲存	2-8℃ 以下
藥品外觀	