

Biktarvy : Bictegravir+Emtricitabine+Tenofovir AF

藥品學名	Bictegravir+Emtricitabine+Tenofovir AF
商品名	英文：Biktarvy · 中文：吉他韋膜衣錠
劑型含量	每錠含：Bictegravir 50 mg+Emtricitabine 200 mg+Tenofovir alafenamide 25 mg
廠牌	吉立亞(Gilead)
許可證字號	衛部藥輸字第 027570 號
藥理作用	Bictegravir：INSTI (integrase strand transfer inhibitor) Emtricitabine：NRTI (nucleoside reverse transcriptase inhibitor) Tenofovir AF：NRTI (nucleoside reverse transcriptase inhibitor)
適應症	Biktarvy 適用於治療感染第一型人類免疫缺乏病毒(HIV-1)且尚未對嵌入酶抑制劑類藥品、emtricitabine 或 tenofovir 產生抗藥性突變的成人患者。
用法用量	1 tab qd
肝腎功能劑量調整	肝：Child C 不建議使用 腎：Ccr<30 ml/min 不可使用
懷孕分級	Fetal risk cannot be ruled out
藥物動力學	吸收：生體可用率 Bictegravir 無數據；Emtricitabine 93 %；Tenofovir AF 無數據 分布：蛋白結合率 Bictegravir >99 %；Emtricitabine <4 %；Tenofovir AF 80 % 代謝：Bictegravir CYP3A/UGT1A1；Emtricitabine 未明顯；Tenofovir AF Cathepsin A /CES1 排除：Bictegravir 腎 35 %；Emtricitabine 腎 70 %；Tenofovir AF 腎<1 % 半衰期：Bictegravir 17.3 h；Emtricitabine 10 h；Tenofovir AF 0.51 h
禁忌	禁與 rifampin 併用。
注意事項	1.下列患者慎用：肝/腎功能不全 2.在開始治療前或開始治療時，應檢測是否患有慢性 B 型肝炎病毒感染。 3.併服多價陽離子需間隔 2 小時。 4.藥物交互作用：phenytoin、oxcarbazepine。
副作用	腹瀉、噁心、頭痛、疲倦、暈眩、失眠、夢異常。
健保類別	健保限制藥品：依抗人類免疫缺乏病毒藥品使用規範
健保價	440 元
藥品儲存	<30°C以下
藥品外觀	