

Cefoperazone/Sulbactam

藥品學名	Cefoperazone/Sulbactam		
商品名	英文：Brosym · 中文：博益欣		
劑型含量	每 vial 含:Cefoperazone 1g+Sulbactam 1g		
廠牌	東洋		
許可證字號	衛署藥製字第 058156 號		
藥理作用	Cefoperazone：結合在細菌細胞壁上的青黴素結合蛋白 (penicillin-binding proteins · PBP _s) · 抑制細菌細胞壁合成。Sulbactam：β 內醯胺酶(β-lactamase)的抑制劑。		
適應症	適用於治療由感受性細菌所引起的下列感染：上/下呼吸道感染、上/下泌尿道感染、腹膜炎、膽囊炎、膽管炎及其它腹腔內感染、骨盆發炎、子宮內膜炎及其它生殖道感染、以及創傷燙傷、手術後之二次感染。		
用法用量	靜脈注射/輸注 成人：2g-4g q12h 兒童：每公斤 20mg/20mg - 80mg/80mg 分 2-4 次投與		
肝腎功能劑量調整	廠商建議 Cefoperazone/Sulbactam	Micromedex Cefoperazone	仿單 Cefoperazone/Sulbactam
	腎功能不全不需調整	腎功能不全不需調整	Ccr>30 4g/4g Ccr15-30 2g/2g Ccr≤15 1g/1g
	Child-Pugh C 小心使用	肝功能不全 Max: 4g	無數據
懷孕分級	無數據		
藥物動力學	分布：蛋白結合率 Cefoperazone 82-93%；Sulbactam 38% 代謝：Cefoperazone/Sulbactam 幾乎無法代謝 排除：Cefoperazone 膽汁/腎臟 20-30%；Sulbactam 尿 75-85% 半衰期：Cefoperazone 2h；Sulbactam 1-1.3h		
禁忌	對本品成分過敏。		
注意事項	1.下列患者慎用：肝功能不全、腎功能不全、經口攝食不良、缺乏維他命 K 而有出血症狀、老人。 2.靜脈注射應緩慢，注射時間不少於 3 分鐘。 3.藥物交互作用：heparin、warfarin。		
副作用	腹瀉、發疹、發燒、肝酵素上升。		
健保類別	健保給付藥品		
健保價	463 元		
藥品儲存	<25°C以下		
藥品外觀			