

Daptomycin

藥品學名	Daptomycin
商品名	英文: Cubicin 中文: 救必辛
劑型含量	500 mg/vial
廠牌	東洋
許可證字號	衛署藥輸字第 024565 號
藥理作用	與細菌細胞膜結合後引起膜電位快速的去極化及膜電位的消失，進而抑制細菌蛋白質、DNA 和 RNA 的合成，引起細菌死亡
衛生署核可適應症	治療感受性革蘭氏陽性菌引起的複雜皮膚性和皮膚組織感染。Staphylococcus aureus 引起之血液感染（菌血症）包括由具有 methicillin 感受性及抗藥性菌株造成之右側感染性心內膜炎
用法用量	4-6 mg/kg/day IV infusion over 30 mins
懷孕分級	B 級
藥物動力學	分布：蛋白質結合率 90-93 % 代謝：無抑制或誘導 CYP450 排泄：腎臟 78 % 半衰期：7.7-8.3 h
禁忌	本品成份過敏
注意事項	1.併用 HMG-CoA inhibitor 可能增加肌肉病變 2.腎功能不佳患者須調整劑量
副作用	腹瀉、嘔吐、橫紋肌溶解、eosinophilic pneumonia
健保類別	健保給付藥品
健保規定	1.證實為 MRSA 複雜皮膚和皮膚組織感染，且證明 vancomycin 抗藥菌株或使用 vancomycin、teicoplanin 治療失敗者或對 vancomycin、teicoplanin 治療無法耐受者。 2.其他抗藥性革蘭氏陽性菌引起的複雜皮膚和皮膚組織感染或 MRSA 菌血症(含右側感染性心內膜炎)，因病情需要經感染症專科醫師會診確認需要使用者(申報費用時需檢附會診及相關之病歷資料)。
健保價	3769 元
藥品儲存	儲存於 2-8 °C
總結	MRSA 感染對於 glycopeptide 治療失敗、無法耐受或過敏之藥物