

## Insulin Detemir

<b>商 品 名</b>	英文: Levemir 中文: 瑞和密爾
<b>劑型含量</b>	100 U / ml
<b>廠 牌</b>	諾和諾德
<b>許可證字號</b>	衛署菌疫輸字第 000810 號
<b>藥理作用</b>	長效型胰島素製劑
<b>衛生署核可適應症</b>	糖尿病
<b>用法用量</b>	依個人情況調整,SC 一天 1-2 次,第 2 次投與可在晚餐或睡前投予
<b>懷孕分級</b>	C 級
<b>藥物動力學</b>	吸收：生體可用率 60% 分布：蛋白質結合率 98% 代謝：缺乏資料 排泄：缺乏資料 半衰期：5-7 小時
<b>禁 忌</b>	低血糖
<b>注意事項</b>	1. 下列患者應調整劑量：肝腎功能不全、疾病、壓力、情緒混亂 2. 不建議與其他胰島素製劑混合注射 3. 更換胰島素廠牌/強度/類型/種類/製造方法時，須注意劑量調整
<b>副作用</b>	低血糖、注射部位過敏/脂質萎縮、水腫、過敏反應
<b>健保類別</b>	健保給付藥品
<b>健保規定</b>	--
<b>健 保 價</b>	454 元
<b>藥品儲存</b>	未使用儲存於 2~8°C，室溫下
<b>藥品外觀</b>	
	筆型胰島素