


## Dienogest

藥品學名	Dienogest
商品名	英文：Omorose，中文：適位紓錠
劑型含量	2 mg/tab
廠牌	培力
許可證字號	衛部藥製字第 060436 號
藥理作用	Dienogest 為第四代黃體激素，與人類子宮黃體素受體結合，產生強效黃體素作用，且有抗雄性激素的活性。Dienogest 對子宮內膜異位症的作用藉由減少內源性雌二醇，會造成雌激素低下、黃體素過多的內分泌環境，使子宮內膜組織開始蛻膜化，導致子宮內膜異位病灶的萎縮。
適應症	治療子宮內膜異位症伴隨之骨盆腔疼痛。
用法用量	2 mg QD PO
肝腎功能劑量調整	肝功能不全：禁用於正在或曾經罹患重度肝臟疾病的患者。 腎功能不全：重度腎功能不全患者應謹慎使用。
懷孕分級	無
藥物動力學	吸收：生體可用率 91% 分布：蛋白結合率 90% 代謝：主要由肝臟 CYP3A4 代謝 排除：尿液：糞便=3：1 半衰期：9~14hr
禁忌	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 活性期靜脈血栓栓塞疾病</li> <li>2. 目前動脈及心血管疾病或有其病史(例如心肌梗塞、腦中風、缺血性心臟病)</li> <li>3. 合併血管相關併發症之糖尿病</li> <li>4. 現有或曾患嚴重肝臟疾病且肝功能的各項數值未回復至正常值</li> <li>5. 現有或曾有肝臟腫瘤 (良性或惡性)</li> <li>6. 已知或疑似罹患性荷爾蒙依賴型惡性腫瘤</li> <li>7. 未經診斷的陰道出血</li> </ol>
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 下列患者慎用:嚴重子宮出血、循環障礙(動靜脈血栓)、憂鬱症病史、半乳糖不耐者、糖尿病患者。</li> <li>2. 使用期間如果需避孕，應使用非荷爾蒙避孕方式。</li> </ol>
交互作用	CYP3A4 Inducer：Phenytoin、Rifampicin、Oxcarbazepine CYP3A4 Inhibitor：Erythromycin
G6PD/青光眼 注意事項	無
副作用	體重增加、情緒憂鬱、睡眠障礙、乳房不適、頭痛、胃腸不適、熱潮紅子宮/陰道出血。

健 保 類 別	健保給付藥品。
健 保 價	37.8 元
藥 品 儲 存	<25°C 以下
藥 品 外 觀	
系 統 管 控	無