


Dinalbuphine Sebacate

藥品學名	Dinalbuphine sebacate	
商品名	英文：Naldebain · 中文：納疼解	
劑型含量	150 mg/2 ml/vial	
廠牌	聯亞	
許可證字號	衛署藥製字第 059637 號	
藥理作用	Dinalbuphine sebacate 為合成的 nalbuphine 前驅藥，經吸收後被酯解酶水解為 nalbuphine Nalbuphine 主要是 kappa 作用劑 / 部分 mu 拮抗劑之止痛劑	
適應症	對預期手術後之中、重度急性疼痛，以預先給藥的方式緩解	
用法用量	150 mg IM stat	
肝腎功能劑量調整	腎功能不全:不需調整劑量 肝功能不全:需小心使用	
懷孕分級	Fetal risk cannot be ruled out.(D)	
藥物動力學	分布：蛋白結合率 90 % 代謝：Nalbuphine sebacate 吸收後被酯解酶水解 nalbuphine · nalbuphine 肝臟(CYP 450)代謝 排除：腎 半衰期：83.2 h	
禁忌	本品為肌肉注射劑，禁止用於靜脈注射。	
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 下列患者慎用: 開車或操作機器等具危險性的工作者、孕婦、肝腎功能不全、頭部外傷。 2. 藥物交互作用：clopidogrel、lorazepam、baclofen、clonazepam、haloperidol、diazepam、alprazolam、midazolam、propofol、zolpidem、estazolam、sulpiride、quetiapine、fentanyl、desmopressin、metoclopramide、tramadol、trazodone、morphine、diphenhydramine、imipramine、paroxetine。 3. 藥物約 12-24 小時達到止痛效果，疼痛效果可以維持一周。 4. 非管制性鴉片類止痛藥物，止痛效果與 morphine 相當。 5. 與其他鴉片類藥物併用，可能產生戒斷症狀。 6. 自然產不適合使用。 	
副作用	注射部位反應、發熱、胃腸不適、眩暈	
健保類別	自費藥品(美體中心使用)	
自費價	10000 元	
藥品儲存	25°C 以下避光儲存	
藥品外觀		
系統管控	限自費使用	