

Fluconazole

藥品學名	Fluconazole
商品名	英文：Diflucan · 中文：泰復肯
劑型含量	50 mg/cap
廠牌	Pifzer
許可證字號	衛署藥輸字第 021779 號
藥理作用	triazole 類抗黴菌劑，具選擇性抑制黴菌 sterol 的合成。
適應症	念珠球菌局部或全身感染、囊珠菌感染、預防後天免疫缺乏症候群病人的黴菌感染。
用法用量	陰道念珠菌炎 150 mg single dose 食道念珠菌炎 200-400 mg qd(3 to 6 mg/kg) 14-21 天 口咽念珠菌炎 100-200 mg qd 7-14 天 隱球菌腦膜炎 Induction:12 mg/kg IV QD 2-6 週,Consolidation 400-800 mg PO QD 8 週, Maintenance:200-400 mg PO QD 12 個月 念珠菌血症 initial: 800 mg qd (12mg/kg) than 400 mg qd (6mg/kg)
肝腎功能劑量調整	腎功能不全 Ccr <50 ml/min: 1/2 usual dose 肝功能不全：不需調整劑量
懷孕分級	Fetal risk cannot be ruled out (C 級)
藥物動力學	吸收：生體可用率 90% 分布：蛋白結合率 11-12% 代謝：肝 11% 排泄：腎 80%原型 半衰期：30 h
禁忌	對本品過敏，禁止併用 amiodarone、clarithromycin、haloperidol、propafenone、quetiapine、tamoxifen、trazodone、voriconazole。
注意事項	1. 下列患者慎用：心律不整、重度心衰竭、肝腎功能不全、老年人。 2. 交互作用：經 CYP2C9、CYP2C19 及 CYP3A4 代謝之藥物。 3. 腎功能不全者應調整用法用量。 4. 肝疾患者應監測肝功能指數。
副作用	胃腸不適、頭痛、皮疹。
健保類別	健保限制藥品：Fluconazole 錠劑膠囊限 1.全身黴菌感染之治療。 2.免疫不全病例，治療或預防黴菌感染時使用。 3.非愛滋病隱球菌腦膜炎患者使用，原則上使用 6 到 8 週，視病人臨床反應，抗原效價及培養結果調整療期，而治黴菌藥物之終止以效價下降四倍及兩次培養陰性為原則。 4.用於念珠性陰道炎，限頑固性疾病或無性經驗病人無法使用塞劑治療者單一劑量使用。

健 保 價	26.1 元
藥 品 儲 存	25°C 以下
藥 品 外 觀	
系 統 管 控	限感染科開立。