

Granisetron

藥品學名	Granisetron
商品名	英文：Grantron，中文：康斯吐
劑型含量	3 mg/3 mL/amp
廠牌	美時
許可證字號	衛署藥製字第 049177 號
藥理作用	選擇性抑制位於迷走神經末端及後咽囊區之化學接受感應區中心的 5-HT ₃ 受體，產生止吐作用
適應症	預防及治療抗腫瘤化學/放射線療法引起的噁心、嘔吐。治療手術後引起的噁心、嘔吐。
用法用量	手術後的噁心嘔吐：1 mg IV >30 秒
肝腎功能劑量調整	不需要
懷孕分級	無數據
藥物動力學	吸收：生體可用率 100% 分布：蛋白結合率 65% 代謝：肝 CYP3A 排泄：腎 49% 糞便 34% 半衰期：8.63 h
禁忌	對本品過敏
注意事項	1. 下列患者慎用：腸阻塞、腹部手術、心臟疾病、電解質異常。 2. 藥物交互作用：Amiodarone、Azithromycin、Ciprofloxacin、Clarithromycin、Fluconazole、Hydroxychloroquine、Levofloxacin、Moxifloxacin、Morphine、Nalbuphine、Prochlorperazine、Quetiapine、Sulpiride 3. 稀釋後輸注液的存放期限為 24 小時。
副作用	頭痛、嗜睡、便秘、過敏、發燒、血清素症候群、ALT/AST 升高、QT interval 延長
健保類別	健保限制藥品，用於術後噁心嘔吐使用不申報不計價
健保價	450 元
藥品儲存	< 25°C 以下，避光儲存
藥品外觀	

