Ibuprofen suspension

藥品學名	Ibuprofen suspension
商品名	英文：Idofen ，中文：舒抑痛 糖漿劑
劑型含量	1200 mg / 60 ml
廠牌	生達化學製藥
許可證字號	衛部藥製字第 045438 號
藥理作用	NSAID 藥物，抑制 prostaglandin 的合成，因而降低發炎，達到止痛、解熱的功效。
適應症	消炎、鎮痛、解熱。
用法用量	孩童解熱、止痛：6 個月-12 歲，0.25-0.5 ml/kg TID-QID，每日最高劑量 2 ml/kg。 幼年性關節炎：每天 1-2 ml/kg TID-QID。
肝腎功能劑量調整	嚴重肝腎功能不全禁用
懷孕分級	D 級
藥物動力學	吸收：生體可用率 92% 分布：蛋白結合率 99% 代謝：肝 CYP2C9 排除：腎 半衰期：1.8-2.44 h
禁忌	1. 消化性潰瘍、出血或穿孔患者；NSAIDs相關腸胃道出血或穿孔病史者；具反覆發作之消化性潰瘍或出血病史者。 2. 嚴重出血傾向之患者。 3. 嚴重肝衰竭、嚴重腎衰竭。 4. 服用 aspirin 或其他非類固醇消炎藥之後曾發生氣喘、蕁麻疹或其他過敏反應者。此類病人曾有嚴重(極少數為致死性)類過敏反應發生之報告。 5. 進行冠狀動脈繞道手術之後 14 天內禁用本藥。
注意事項	1.下列患者慎用:患有消化性潰瘍、血液異常、肝腎功能不全、心機能障礙、支氣管氣喘。 2. NSAIDs 藥品會增加發生嚴重心血管栓塞事件之風險，包括心肌梗塞和中風，且可能為致命的。此風險可能發生在使用該類藥品的初期，且使用藥品的時間越長，風險越大。
交互作用	Ketorolac、Aspirin、Paroxetine、Escitalopram、Duloxetine、Venlafaxine、Vortioxetine、Imipramine Mirtazapine、Furosemide、Torsemide、Spironolactone、Indapamide、Hydrochlorothiazide、Fluconazole、Enoxaparin、Ginkgo、Clopidogrel、Cilostazol、Dipyridamole、Pentoxifylline、Celecoxib、Etoricoxib、Potassium citrate、Digoxin、Emtricitabine (Odefsey/Biktarvy/Truvada) Tenofovir、Heparin、Warfarin、Edoxaban、Rivaroxaban、Desmopressin、Trazodone、Methotrexate、Cortisone、Prednisolone、Hydrocortisone、Dexamethasone、Fluticasone、Budesonide
G6PD/青光眼注意事項	無
副作用	腸胃不適、水腫、體液滯留、暈眩、頭痛、皮膚發紅搔癢

健 保 類 別	健保給付藥品
健 保 價	25 元/瓶
藥 品 儲 存	25°C 以下儲存
藥 品 外 觀	
系 統 管 控	限 12 歲以下兒童使用。