


## Leuprorelin acetate

藥品學名	Leuprorelin acetate	
商品名	英文：Eligard · 中文：癌立佳持續性藥效皮下注射劑	
劑型含量	22.5 mg/syringe(預充式注射器)	
廠牌	Astellas	
許可證字號	衛部藥輸字第 026305 號	
藥理作用	合成的第九胜肽天然促性腺激素釋放激素作用劑，持續地投與會抑制腦下垂體分泌促性腺激素，抑制男性睪丸類固醇的生成。	
適應症	用於晚期前列腺癌紓解治療，以及與放射治療併用於高風險的局部和局部晚期荷爾蒙依賴型前列腺癌治療。	
用法用量	22.5 mg Q3M SC	
肝腎功能劑量調整	無資料	
懷孕分級	禁忌 X	
藥物動力學	吸收：生體可用率:近似 IV 代謝：Hydrolysis via peptidase enzyme 半衰期：3h	分布：protein binding 43-49 % 排除：腎臟<5%
禁忌	對其他 GnRH 作用劑過敏、曾接受睪丸切除術、婦女、兒童	
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>下列患者慎用：先天 long-QT syndrome、CHF、電解質不平衡、骨鬆家族史者、癩癩史、腦血管疾患、氣喘。</li> <li>藥物交互作用: hydroxychloroquine、amiodarone、mirtazapine。</li> <li>混合前 30 分鐘先由冰箱取出回溫，配製完成後須立即使用。</li> <li>限皮下注射(選擇皮下組織足夠處，例如上、中腹部、臀部上方)，注射部位應每次變換。</li> </ol>	
副作用	熱潮紅、胃腸不適、瘀斑、紅斑、疲勞、注射部位灼熱/感覺異常、乳房觸痛、睪丸萎縮、勃起障礙	
健保類別	健保給付藥品	
健保價	9025 元	
藥品儲存	原包裝儲存於 2-8°C，室溫<25°C 以下存放 4 週。	
藥品外觀		
系統管控	限泌尿科使用，適應症勾選。	