


Liraglutide

藥品學名	Liraglutide
商品名	英文：Saxenda，中文：善纖達注射液
劑型含量	18 mg/ 3 ml /pen (6 mg/ml)
廠牌	Novo Nordisk
許可證字號	衛部菌疫輸字第 001140 號
藥理作用	GLP-1 作用劑，藉由抑制腦內調節食慾接受體，增加飽足訊息減少飢餓訊息，進而使體重減輕。
適應症	用於體重控制，作為低熱量飲食及增加體能活動外之輔助療法，適用對象為成人病人且初始身體質量指數(BMI)為 1. $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ 2. $\geq 27\sim 30 \text{ kg/m}^2$ ，且病人至少有一項體重相關共病，例如第二型糖尿病、高血壓或血脂異常 以每天 3.0 mg 治療 12 周後，若病人初始體重並未減輕至少 5%，應停止治療。
用法用量	起始 0.6 mg/day SC。每周增加 0.6 mg 至 3.0 mg/day
肝腎功能劑量調整	不須調整劑量
懷孕分級	禁忌 (X)
藥物動力學	吸收：身體可用率 55% (SC) 分布：蛋白結合率 > 98% 代謝：Not significant 排除：腎臟 6%、糞便 5% 半衰期：12.3-13 hrs
禁忌	本身或家族有甲狀腺髓質癌病史、罹患第二型多發性內分泌腫瘤症候群、孕婦
注意事項	1. 下列患者慎用：胰臟炎、肝/腎功能不全、甲狀腺結節、CHF NYHA 第 IV 級 2. 藥物交互作用：Hydroxychloroquine、Ciprofloxacin、Levofloxacin、insulin、octreotide 3. 不可用於 T1DM 或用於治療糖尿病酮酸中毒，也不能替代胰島素。
副作用	低血糖、胃腸道不適、頭痛、上呼吸道感染
健保類別	自費藥品
藥品儲存	未開封：2-8°C；開封：2-8°C 或 <30°C
藥品外觀	
系統管控	限自費使用