

Nalbuphine

藥品學名	Nalbuphine
商品名	英文：Bain，中文：芯奔
劑型含量	10 mg/1ml/amp
廠牌	健亞
許可證字號	衛署藥製字第 048167 號
藥理作用	鴉片類止痛劑：作用於 kappa 作用劑和部分 mu 拮抗作用。
適應症	解除中度到嚴重疼痛，也可作為平衡麻醉的輔助劑。
用法用量	中至重度疼痛:10 mg q3-6h prn IM/IV/SC,極量:20 mg/次,160 mg/天 平衡麻醉的輔助劑:誘導 0.3-3 mg/kg IV over 10-15 min,維持 0.25-0.5 mg/kg IV over 10-15 min prn
肝腎功能劑量調整	肝腎功能不全需調整劑量
懷孕分級	B
藥物動力學	吸收：無資料 分布：無資料 代謝：肝 排泄：腎 7%，糞便-大部分 半衰期：2.2-2.6h
禁忌	呼吸抑制、急性嚴重支氣管氣喘發作、胃腸道阻塞
注意事項	1.下列患者慎用：循環性休克、老人、情緒不穩定、肝腎功能不全、頭部外傷、意識不清、昏迷、顱內病變、鴉片藥物濫用、呼吸功能不全、癲癇、膽道疾患。 2.藥物交互作用：clopidogrel、lorazepam、baclofen、clonazepam、haloperidol、diazepam、alprazolam、midazolam、propofol、zolpidem、estazolam、sulpiride、quetiapine、fentanyl、desmopressin、metoclopramide、tramadol、trazodone、morphine、diphenhydramine、imipramine、paroxetine。 3.與其他鴉片類藥物併用，可能產生戒斷症狀。 4.長期使用突然停藥，可能產生戒斷症狀。
副作用	鎮靜、出汗、胃腸不適、頭暈、頭痛、高/低血壓、呼吸抑制、過敏
健保類別	健保給付藥品
健保價	40.1 元/tab
藥品儲存	< 25°C 以下
藥品外觀	

