

Naproxen

商 品 名	英文：Proxen，中文：珀拿舒
劑 型 含 量	375 mg/ tab
廠 牌	田邊
許 可 證 字 號	衛署藥製字第 031778 號
藥 理 作 用	屬於 NSAID 藥物，藉由抑制 cyclooxygenase(COX-1，COX-2)，達到止痛、抗發炎、退燒之效果。
適 應 症	慢性風濕關節炎、變形性關節症、痛風、強直性脊椎炎、腰痛症、肩關節周圍炎、頸肩腕症候群、腱鞘炎、急性上呼吸道炎、特發性痛經等疾患之消炎、鎮痛、解熱，口腔、外科領域中拔牙及小手術後的消炎、鎮痛。
用 法 用 量	375mg BID
肝 腎 功 能 劑 量 調 整	Ccr<30 ml/min：不建議使用 肝功能不佳：建議使用最低劑量
懷 孕 分 級	C
藥 物 動 力 學	吸收：生體可用率 95 % 分布：蛋白結合率 99 % 代謝：肝 排泄：腎 95% 半衰期：12-17 h
禁 忌	對 NSAID 或 aspirin 過敏、CABG 手術
注 意 事 項	1.下列患者慎用：氣喘、肝腎功能不全、心血管疾病、懷孕後期、消化性潰瘍/出血/穿孔、高血壓、近期 MI。 2.藥物交互作用：duloxetine、venlafaxine、imipramine、paroxetine、enoxaparin、spiro lactone、dihydrochlorothiazide、furosemide、bumetanide、diclofenac、dipyridamole、clopidogrel、heparin、warfarin、dabigatran、MTX、aspirin、desmopressin、corticosteroids、digoxin。
副 作 用	過敏、胃腸不適、出血
健 保 類 別	健保給付藥品
健 保 價	2.31 元
藥 品 儲 存	避光儲存
藥 品 外 觀	