

## Nemonoxacin Malate Hemihydrate

藥品學名	Nemonoxacin
商品名	英文：Taigexyn · 中文：太捷信膠囊/靜脈輸液
劑型含量	250 mg/cap ; 500 mg/250 ml/bag
廠牌	太景生物科技
許可證字號	衛部藥製字第 058540 ; 060558 號
藥理作用	Non-fluorinated quinolone 類抗生素，經由抑制 DNA gyrase 與 topoisomerase IV，抑制細菌 DNA 合成，進而抑制細菌生長。
適應症	治療對 Nemonoxacin 有感受性的致病菌所引起之成人社區型肺炎。
用法用量	口服：Nemonoxacin 500 mg (2#) QD AC(會受高脂肪餐影響) 注射：Nemonoxacin 500 mg (250 ml) QD IVD，滴注時間不少於 90 分鐘。 建議的治療時間是連續使用 7 至 14 天。
肝腎功能劑量調整	腎功能不全： Ccr 60-90 ml/min：500 mg qd Ccr <60 ml/min：不建議使用 肝功能不全：不建議使用
懷孕分級	C 級 (仿單建議懷孕婦女禁用)
藥物動力學	分布：蛋白結合率 44-48%                      代謝：肝 conjugation 排除：腎 70%                                      半衰期：11-12 h
禁忌	對本品成分、其他喹諾酮類過敏、兒童或青少年懷孕或哺乳婦女。
注意事項	1. 下列患者慎用：肝腎功能不全、CNS 疾病、糖尿病、重症肌無力、心律不整、QT 波延長、低血鉀、併用 QT 波延長藥品/皮質類固醇、老人、18 歲以下兒童、哺乳婦。 2. 併服制酸劑或金屬陽離子需間隔 2 小時。 3. 可能出現光敏感副作用，應避免強光照射。
交互作用	制酸劑、金屬陽離子(鈣除外)
G6PD/青光眼	無
副作用	腸胃不適、頭痛、暈眩、肝指數上升、嗜中性白血球減少症、白血球計數降低。
健保類別	健保限制藥品： 1. 膠囊劑限用於 18 歲以上適合於門診治療之輕度社區性肺炎。 2. 注射劑限用治療對 Nemonoxacin 有感受性的致病菌所引起之 18 歲以上社區型肺炎。
健保價	171 元/cap · 2200 元/bag
藥品儲存	<30°C 以下
系統管控	列為照會管制性抗生素，IV 需會診感染科醫師，口服需勾選適應症選項。

藥品外觀

