

Odefsey : Rilpivirine +Emtricitabine+Tenofovir AF

藥品學名	Rilpivirine +Emtricitabine+Tenofovir AF
商品名	英文：Odefsey，中文：安以斯膜衣錠
劑型含量	每錠含：Rilpivirine 25 mg+Emtricitabine 200 mg+Tenofovir AF 25 mg
廠牌	嬌生
許可證字號	衛部藥輸字第 027505 號
藥理作用	Rilpivirine：NNRTI (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor) Emtricitabine：NRTI (nucleoside reverse transcriptase inhibitor) Tenofovir AF：NRTI (nucleoside reverse transcriptase inhibitor)
適應症	先前未曾使用過抗病毒藥物治療之愛滋病毒(HIV-1)感染之完整治療，且在治療開始時其病毒量 HIV-1 RNA \leq 100,000 copies/mL 之 12 歲以上(體重至少 35 公斤)患者；適用於特定正穩定接受抗反轉錄病毒療法，且治療開始時已達病毒學抑制狀態(HIV-1 RNA <50 copies/mL)的患者，取代其現有的抗反轉錄病毒療法。對 emtricitabine/ rilpivirine/ tenofovir 的任一成分，患者過去或現在應無抗藥性病史才適用。
用法用量	1 tab qd with meal
肝腎功能劑量調整	肝：Child C 不建議使用 腎：Ccr<30 ml/min 不可使用
懷孕分級	Fetal risk cannot be ruled out
藥物動力學	吸收：生體可用率 Rilpivirine 無數據；Emtricitabine 93 %；Tenofovir AF 無數據 分布：蛋白結合率 Rilpivirine 99.7 %；Emtricitabine <4 %；Tenofovir AF 80 % 代謝：Rilpivirine CYP3A；Emtricitabine 未明顯；Tenofovir AF Cathepsin A /CES1 排除：Rilpivirine 腎 6.1 %；Emtricitabine 腎 70 %；Tenofovir AF 腎<1% 半衰期：Rilpivirine 50 h；Emtricitabine 10 h；Tenofovir AF 0.51 h
禁忌	對本品成分過敏、禁與voriconazole併用。
注意事項	1.下列患者慎用：Torsade de pointes 高風險族群、肝/腎功能不全。 2.接受治療婦女應避免懷孕/哺乳。 3.小於 12 歲病人不建議使用。 4.建議隨餐服用，不可嚼碎、磨碎或剝開。 5.併服多價陽離子需間隔 2 小時。 6.藥物交互作用：rifampin、fluconazole、voriconazole、clarithromycin、phenytoin、dexamethasone、oxcarbazepine、moxifloxacin、levofloxacin、omeprazole、pantoprazole、esomeprazole。
副作用	噁心、暈眩、夢異常、頭痛、失眠、白血球減少、總膽固醇升高、ALT/AST 上升。
健保類別	健保限制藥品：依抗人類免疫缺乏病毒藥品使用規範
健保價	440 元/錠
藥品儲存	<30°C以下

藥品外觀

