

Penicillin G sodium

藥品學名	Penicillin G sodium
商品名	英文：Penicillin G sodium · 中文：苄基青黴素鈉
劑型含量	300 萬 U/vial
廠牌	永豐
許可證字號	衛署藥製字第 15845 號
藥理作用	經由結合在細菌細胞壁上的青黴素結合蛋白 (penicillin-binding proteins · PBPs) · 抑制細菌細胞壁合成。
適應症	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具感受性細菌引起之感染症。
用法用量	100 萬-2400 萬 U/day q4-6h IV or IM
肝腎功能劑量調整	eGFR 10-50 ml/min : 75% normal dose eGFR <10 ml/min : 20-50% normal dose 血液透析：維持劑量透析後給予
懷孕分級	B
藥物動力學	吸收：生體可用率 72% 分布：蛋白結合率 65 % 代謝：肝 30% 排除：腎臟 79-85 % 半衰期：20-50 mins
禁忌	對penicillin過敏
注意事項	1.下列患者慎用：氣喘、cephalosporin 過敏、腎功能不全。 2.藥物交互作用：tetracyclines、methotrexate、warfarin。
副作用	血球異常、過敏反應、胃腸不適。
健保類別	健保給付藥品
健保價	106 元
藥品儲存	<25°C 以下
藥品外觀	