


Pimecrolimus cream

藥品學名	Pimecrolimus
商品名	英文：Elidel cream · 中文：醫立妥軟膏
劑型含量	1%, 15 g/tube
廠牌	邁蘭
許可證字號	衛署藥輸字第 023645 號
藥理作用	Pimecrolimus 是一具抗發炎作用的囊黴素巨內醯胺(ascomycin macrolactam)衍生物，可以選擇性地抑制 T 細胞及肥大細胞產生及釋發出發炎前驅物-細胞素及介質。
適應症	第二線使用於 3 個月以上兒童、青少年及成人異位性皮膚炎之短期及間歇性長期治療。
用法用量	每天兩次，適量輕輕地塗抹均勻於患部上。
肝腎功能劑量調整	無資料
懷孕分級	B
藥物動力學	吸收：無資料 分布：無資料 代謝：主要由肝臟 CYP3A 代謝 排除：糞便 半衰期：無資料
禁忌	對本品過敏。
注意事項	1. 下列患者慎用：孕婦及哺乳婦、免疫損害病人。 2. 避免使用於急性感染、嚴重發炎/受損或 Netherton 症候群之皮膚部位。 3. 不建議合併使用閉塞性敷料。 4. 使用後應避免陽光曝曬。
交互作用	無
G6PD/青光眼	無
副作用	灼熱感、皮膚刺激反應及感染。
健保類別	健保限制藥品 限 2 歲以上且患部面積>30%之中、重度異位性皮膚炎，或敏感性皮膚部位(頭頸部、眼 瞼、耳後區、生殖器、皮膚彎曲處、腋下、鼠蹊部)異位性皮膚炎之下列病患第二線使用： 1.成人患部面積 30%~50%，每星期不超過 30gm；患部面積>50%，每星期不超過 60gm。 2.孩童患部面積 30%~50%，每兩星期不超過 30gm；患部面積>50%，每星期不超過 30gm。 3.敏感性皮膚部位(頭頸部、眼瞼、耳後區、生殖器、皮膚彎曲處、腋下、鼠蹊部)異位性皮膚炎部分：成人每月不超過 30gm，孩童每月不超過不超過 20gm，且不

	<p>得與全身用藥分開計算。</p> <p>4.使用一個月後，症狀若無改善，應改用其他藥物治療。</p> <p>5.以三個月為一個療程，作間歇性長期治療者，若需繼續治療，每月限使用 30 公克。</p> <p>6.不可合併紫外線治療。</p>
健 保 價	384 元
藥 品 儲 存	<25°C 以下
藥 品 外 觀	
系 統 管 控	無