

## Propacetamol

藥品學名	Propacetamol
商品名	英文：Acetamol injection，中文：舒疼消熱注射劑
劑型含量	1g /vial (0.5g acetaminophen)
廠牌	生達
許可證字號	衛署藥製字第 049126 號
藥理作用	鎮痛作用:在中樞抑制 cyclooxygenase 作用，抑制前列腺素(prostaglandin)的生成，抑制引起疼痛化學物質的生成。
適應症	在無法使用口服投藥方式時，用於疼痛或發燒之症狀治療。
用法用量	靜脈注射，限用於成人或 4 歲以上 ( 或體重 17 公斤以上 ) 之孩童。 孩童：30mg/kg/dose q6h，每日劑量<120 mg/kg propacetamol 成人：1-2 g q4h，MAX:8 g
肝腎功能劑量調整	肝功能不全：不需調整劑量 CCr<10 ml/min:q8h 給藥
懷孕分級	D 級
藥物動力學	分布：蛋白結合率 10-25 %； 代謝：主要由肝； 半衰期：2-3h 排除：尿液<5%、膽汁:2.6%。
禁忌	嚴重肝功能障礙
注意事項	1.下列患者慎用：肝功能不全、酗酒、低血容、嚴重腎功能不全、懷孕前 3 個月。 2.靜脈注射藥品調配後，需於 30 分鐘內使用。不要與其他藥品混合使用。 3.使用專用溶劑(sodium citrate)溶解均勻，再取出所需用量，處理時請戴手套(易有接觸性溼疹)。
交互作用	13 價 pneumococcal vaccine、白喉疫苗、INH
G6PD/青光眼	無
副作用	眩暈、嘔吐、注射部位疼痛。
健保類別	自費藥品
藥品儲存	<25°C 以下
系統管控	自費使用
藥品外觀	