

Insulin glargine / lixisenatide

藥品學名	Insulin glargine / lixisenatide
商品名	英文：Soliqua，中文：爽胰達注射劑
劑型含量	每支注射筆 3ml，每毫升 Insulin glargine 100 units+ lixisenatide 50 mcg (2:1 混合)。
廠牌	賽諾菲
許可證字號	衛部菌疫輸字第 001080 號
藥理作用	Insulin glargine:長效胰島素，lixisenatide:GLP-1 agonist
適應症	適用於基礎胰島素(每日劑量少於 60 單位)或 lixisenatide 治療時血糖控制不佳的第二型糖尿病成人病人，在飲食與運動外，作為改善血糖之輔助治療。
用法用量	皮下注射 QD，餐前 1 小時給予，起始劑量 10-20 單位
肝腎功能劑量調整	eGFR< 15 mL/min/1.73 m ² 不建議使用
懷孕分級	Fetal risk cannot be ruled out
藥物動力學	吸收：Lixisenatide：2.5-3 h 分布：Lixisenatide：蛋白結合率 55 % 代謝：insulin glargine 會代謝成 2 種活性代謝物 M1 及 M2 排除：Lixisenatide:腎 半衰期：Lixisenatide:3 h；insulin glargine:無資料
禁忌	低血糖、對本品過敏
注意事項	1. 不可用於 Type 1 DM 或用於治療糖尿病酮酸中毒 2. 更換胰島素廠牌/強度/類型/種類/製造方法時，須注意劑量調整。 3. 交互作用：Metoclopramide、Liraglutide、other insulin、Levofloxacin、Ciprofloxacin、Sandostatin
副作用	低血糖、過敏性休克
健保類別	健保限制藥品 1.限用於第二型糖尿病成人病人，當患者已接受 lixisenatide 或基礎胰島素治療仍未達理想血糖控制時，與口服降血糖藥物併用。 2.本藥品不得與 DPP-4 抑制劑、SGLT-2 抑制劑併用。
健保價	1215 元
藥品儲存	未開封：2-8°C；開封：2-8°C或< 30°C
總結	