

Fluticasone furoate/Umeclidinium/Vilanterol trifenate

藥品學名	Fluticasone furoate/Umeclidinium/Vilanterol trifenate
商品名	英文：Trelegy Ellipta，中文：肺樂喜易利達乾粉吸入劑 92/55/22
劑型含量	每錠含：Fluticasone furoate 92 mcg/Umeclidinium 55 mcg/Vilanterol 22 mcg，30 puff/btl
廠牌	GSK
許可證字號	衛部藥輸字第 027395 號
藥理作用	Fluticasone furoate 皮質類固醇，減少呼吸道發炎反應；Umeclidinium 長效型抗膽鹼藥物，可以產生之氣喘擴張效果；Vilanterol 選擇性之 β_2 腎上腺素作用劑，可以促進支氣管擴張。
適應症	適用於已接受吸入性皮質類固醇與長效 β_2 作用劑合併治療，仍然有顯著症狀或惡化(exacerbations)控制不佳之慢性阻塞性肺病(COPD)患者的維持治療。
用法用量	1 puff QD INH
肝腎功能劑量調整	不需調整劑量
懷孕分級	C
藥物動力學	吸收：生體可用率 Fluticasone furoate 15.2 % 分布：蛋白結合率 Fluticasone furoate>99 %; Umeclidinium 89 % , Vilanterol 94 % 代謝：Fluticasone furoate:肝 CYP3A4 ; Umeclidinium:肝 CYP 2D6 ; Vilanterol:肝 CYP3A4 排泄：Vilanterol 腎臟 70 % , 糞便:30 % 半衰期：Fluticasone furoate 24 hs ; Umeclidinium 11 hs ;Vilanterol 11 hs
禁忌	乳蛋白過敏。
注意事項	1. 下列患者慎用：冠狀血管疾病、低血壓、心律不整、剛手術後、攝護腺肥大、膀胱頸阻塞、急性 COPD 惡化或支氣管痙攣。 2. 每日使用不可超過一次。 3. 使用後須漱口，且不可以吞下。
副作用	頭痛、背痛、味覺改變、腹瀉
健保類別	健保限制藥品： (1)限用於慢性阻塞性肺病患者的維持治療，且須同時符合以下條件： I .Gold Guideline Group D 病人或 ACO (asthma-COPD overlap) 病人。 II .已接受吸入性皮質類固醇與長效 β_2 作用劑合併治療，仍然有顯著症狀或惡化控制不佳者。(2)每月限用 1 盒(30 劑)。
健保價	1770 元
藥品儲存	< 30°C 以下避光保存

藥品外觀

