

Triumeq : Abacavir+Dolutegravir+Lamivudine

藥品學名	Abacavir+Dolutegravir+Lamivudine
商品名	英文：Triumeq，中文：三恩美膜衣錠
劑型含量	每錠含：Abacavir 600 mg+Dolutegravir 50 mg+Lamivudine 300 mg
廠牌	GSK
許可證字號	衛部藥輸字第 026518 號
藥理作用	Abacavir：NRTI (nucleoside reverse transcriptase inhibitor) Dolutegravir：INSTI (integrase strand transfer inhibitor) Lamivudine：NRTI (nucleoside reverse transcriptase inhibitor)
適應症	適用於做為人類免疫不全病毒(HIV)感染症的完整治療藥物，適用的對象為未曾使用抗反轉錄病毒藥物治療，或所感染之 HIV 對 Triumeq 中的三種抗反轉錄病毒藥物不具已證實或臨床上疑似之抗藥性的成人患者及 12 歲以上的青少年患者。
用法用量	1 tab qd
肝腎功能劑量調整	肝：Child A 不建議使用，Child B/C 禁忌 腎：Ccr<50 ml/min 不可使用
懷孕分級	Fetal risk cannot be ruled out
藥物動力學	吸收：生體可用率 Abacavir 83 %；Dolutegravir 無數據；Lamivudine 86 % 分布：蛋白結合率 Abacavir 50 %；Dolutegravir 98.9 %；Lamivudine <36 % 代謝：Abacavir 肝 alcohol dehydrogenase；Dolutegravir UGT1A1；Lamivudine trans-sulfoxide 排除：Abacavir 腎 81 %；Dolutegravir 腎 31%；Lamivudine 尿 70 % 半衰期：Abacavir 1.54 h；Dolutegravir 14 h；Lamivudine 5-7 h
禁忌	對本品成分過敏、帶有 HLA-B*5701 對偶基因、中重度肝功能不全。
注意事項	1.下列患者慎用：肝功能不全 2.小於 12 歲病人不建議使用(無法調整劑量)。 3.建議開始治療前進行 HLA-B*5701 對偶基因篩檢。 4.育齡婦女服藥前應驗孕，以避免第一孕期使用，並持續避孕。 5.併服多價陽離子需間隔 2 小時。 6.藥物交互作用：phenytoin、oxcarbazepine、rifampin、metformin。
副作用	皮疹、頭暈、頭痛、失眠、噁心、憂鬱、夢異常、倦怠、腹瀉。
健保類別	健保限制藥品：依抗人類免疫缺乏病毒藥品使用規範
健保價	440 元
藥品儲存	<30°C以下
藥品外觀	