

Vancomycin

藥品學名	Vancomycin
商 品 名	英文：Vancouver，中文：凡可復膠囊
劑 型 含 量	125 mg/cap，40 cap/瓶
廠 牌	友霖生技醫藥股份有限公司
許 可 證 字 號	衛部藥製字第 060316 號
藥 理 作 用	Vancomycin 之殺菌作用，主要是抑制細菌細胞壁的合成，還會改變細胞膜之滲透性和 RNA 的合成。
適 應 症	葡萄球菌腸炎、梭狀桿菌所引起之假膜性結腸炎。
用 法 用 量	成人：500 mg-2 g/d 分 3-4 次口服，治療七至十天。(一個療程一瓶) 兒童：每日劑量 40 mg/kg，分 3-4 次口服，治療七至十天。 極量：2 g/d
肝 腎 功 能 劑 量 調 整	無
懷 孕 分 級	C 級
藥 物 動 力 學	吸收：poorly absorbed 分布：蛋白結合率 55% 代謝：No apparent metabolism 排除：腎臟<0.76% 半衰期：4-6 h
禁 忌	對本品成分過敏者
注 意 事 項	1.下列患者慎用：腎功能不全、老年人、孕婦、授乳婦、小腸粘膜有發炎異常者、併用氨基糖苷抗生素。 2.老年患者較易發生聽覺損害。
交 互 作 用	piperacillin/tazobactam、tobramycin、gentamicin、aspirin、amikacin。
G6PD/青光眼	無
副 作 用	噁心、發冷、發熱、蕁麻疹、紅斑、嗜酸性球增多、類過敏反應和非感受性細菌過度繁殖。
健 保 類 別	健保限制藥品： 1. 限用於梭狀桿菌引起之假膜性結腸炎，且需符合下列診斷方法之一： (1) 內視鏡檢查證實有假膜性結腸炎之病理變化。 (2) 臨床上有腸炎、結腸炎之相關症狀，如腹瀉、腹痛、腸阻塞(ileus)等，加上下列任一種條件：I.糞便檢驗證實有梭狀桿菌之 toxin A 或 toxin B 存在、或其毒素基因存在。 II.糞便細菌培養證實有梭狀桿菌或糞便之抗原檢測證實有 GDH(glutamate dehydrogenase)存在。 2. 申報時應檢附下列報告之一：(1) 內視鏡檢查報告。(2) 臨床症狀敘述，加上 Toxin A+B 檢測報告、糞便細菌培養結果、糞便細菌抗原檢測(GDH)結果或 PCR 基因檢測結果。
健 保 價	60 元/cap
藥 品 儲 存	25°C 以下儲存

藥品外觀

