

引流管照護

Pig-tail (豬尾巴導管)

一、放置目的：

- 移除體內多餘的氣體或液體，適用於肋膜積水、氣胸、血胸、膿胸以及肝臟、腎臟的引流。



二、注意事項：


- 引流管應保持順暢，避免糾結、扭曲或壓迫。
- 更換姿勢時，動作應輕緩，預防管路牽扯或滑脫。
- 引流袋需保持低於傷口，以防止逆流，但勿拖垂於地上（圖一）。
- 下床活動時，可利用安全別針將引流袋固定在衣服下緣（圖二）。
- 隨時注意傷口敷料及管路固定情形，如有異常需告知醫護人員（圖三）。
- 若是無法配合管路留置（意識不清、躁動），必要時可給予保護性約束。
- 引流液超過 1/2 袋時應將引流液倒掉，並觀察引流量、顏色及性狀（圖四）。



（圖一）



（圖二）



（圖三）



（圖四）

〔 圖片來源：網路 〕

三、 需要立即處理的情況：

- 插管後有呼吸困難、呼吸更喘更費力或傷口疼痛等情形。
- 引流管位移，不在原來固定的地方。
- 引流管與引流袋之接合處鬆脫。
- 引流袋破損或引流液倒出。
- 引流量突然減少或無引流量。
- 傷口紅腫熱痛，並有膿樣分泌物。

四、 引流管可拔除時間：

- 通常引流液逐漸減少，主治醫師會考慮移除，但仍須視個別狀況而定。

五、 引流管拔除後的傷口照護：

- 拔除引流管後，醫護人員會持續觀察傷口並定期換藥。
- 拔管後傷口仍需保持乾燥，身體清潔暫時用擦澡方式。
- 拔管後約七至十天，醫師會視傷口情況予以拆線，癒合後即可沐浴。

六、 參考資料：

- 譚蓉瑩（2019）．傷口引流之護理．*內外科護理技術* 9 版（156-164 頁）．台北：華杏。