

人類免疫缺乏病毒（HIV）篩檢注意事項

一、 哪些人需要做愛滋病毒檢驗？

1. 有性行為者，建議至少進行 1 次愛滋篩檢。
2. 有不安全性行為者，建議每年至少進行 1 次愛滋篩檢。
3. 若有感染風險行為（如：感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）、或性伴侶有前述任一情形者，建議每 3 至 6 個月篩檢 1 次。

二、 可以去哪裡做愛滋病毒篩檢？

醫療院所、全國各縣市衛生局及部分民間團體都可以檢驗愛滋病毒，如果不想讓別人知道自己的資料，可搜尋疾病管制署全球資訊網之匿名篩檢名冊 (<https://ppt.cc/frtclx>)，查詢離家近的檢驗點進行預約。另外也可利用愛滋自我篩檢 (<https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest>) 方式初步檢驗，如有陽性反應，請至愛滋指定醫院進一步確認檢驗。

三、 愛滋病毒檢驗作業：

1. **初步篩檢**：不需空腹，採靜脈血液約 5cc，在實驗室進行檢驗，呈現兩次陽性反應者，即為一次初步篩檢陽性，應再次進行確認檢驗。
2. **確認檢驗**：再次核對身分，再另抽一次血液，進行確認檢驗。檢驗結果為陽性者應及早至愛滋病指定醫院進行後續照護及治療；檢驗結果為陰性者，鑒於感染者可能在空窗期，應於 3 個月後再自行至合格檢驗單位篩檢。

✚ 本院篩檢是具名保密檢驗，對於您的檢驗結果及個人隱私，均會妥善保護並負保密之責。篩檢結果若為陽性，將進行西方墨點確認檢驗，西方墨點確認檢驗呈陽性，視為 HIV 感染者，依法通報地方衛生機關，以提供後續就醫轉介服務。另外，本院後門亦有設置「愛滋快速自我篩檢服務機」，為您提供服務！



➤ 愛滋病免費諮詢電話：0800-888995 或疾病管制局諮詢專線：1922。

➤ 資料來源：衛生福利部，疾病管制署