



食道靜脈瘤結紮術檢查後注意事項

- 1.治療後您須**禁食 12~24 小時**，之後三天內先採冰涼的流質飲食，避免過熱飲食，再依耐受性採漸進恢復正常飲食。
- 2.治療後三天內禁止插放鼻胃管，以避免靜脈瘤結紮處再出血。
- 3.治療後可能會有吞嚥會痛、吞嚥困難，故依適應症狀一週內會給予您口服藥磨粉使用。
- 4.治療後可能併發症：靜脈瘤再出血，結紮處潰瘍，食道局部狹窄，暫時性吞嚥，吞嚥困難，吸入性肺炎，食道或胃穿孔，其他靜脈瘤出血、菌血症、縱膈腔發炎、肋膜積水等產生。
- 5.若有服用阿斯匹靈（抗凝血劑）類藥物，請依照醫師指示先停用。
- 6.若有胸痛、腹痛、吞嚥困難、發燒、嘔吐、解黑便、血便等症狀，請立刻就醫，或與本院：
 - (1)內視鏡室聯絡電話：(07) 351-7166 轉 1228
 - (2)急 診 室聯絡電話：(07) 351-7116 轉 1118、1119

健仁醫院 關心您的健康

健仁醫院護理部教育組 102.07 制
108.11 (2 修) /112.03 (檢視)
編號 A801003