

Anoro Ellipta

藥品學名	Umeclidinium /vilanterol
商品名	英文：Anoro Ellipta，中文：安肺樂易利達
劑型含量	1 puff：Umeclidinium 55 mcg/ vilanterol 22 mcg，30 puff/bottle
廠牌	GSK
許可證字號	衛署藥輸字第 026315 號
藥理作用	支氣管擴張:LABA+LAMA
適應症	慢性阻塞性肺病(COPD)患者之氣道阻塞症狀的維持治療。
用法用量	1 puff QD，應每天於相同時間投藥。每 24 小時不可使用超過 1 次
肝腎功能劑量調整	無
懷孕分級	C 級
藥物動力學	吸收：無資料 分布：蛋白結合率 umeclidinium 89%；vilanterol 94% 代謝：umeclidinium CYP2D6；vilanterol CYP3A4 排除：umeclidinium 糞便 58% 腎 22%；vilanterol 糞便 30% 腎 70% 半衰期：11 h
禁忌	對乳品嚴重過敏、氣喘治療(未使用類固醇)
注意事項	1. 下列患者慎用:心血管疾患(冠狀動脈功能不全、心律不整、高血壓)、痙攣性疾病、甲狀腺毒症、狹角性青光眼、尿滯留。 2. 不建議用於急性發作之治療。
交互作用	Potassium salt agent、donepezil、hydroxychloroquine、amantadine、trazodone、levofloxacin、clarithromycin、quetiapine、bupropion、imipramine、propranolol、atenolol、labetalol、carvedilol、bisoprolol、glucagon、mirtazapine、sulpiride、anticholinergic agent、amiodarone、disopyramide、haloperidol、prochloroperazine、tamoxifen、propafenone、famotidine、ciprofloxacin、paroxetine、venlafaxine、risperidone、moxifloxacin、escitalopram
G6PD/青光眼 注意事項	狹角性青光眼小心使用
副作用	咽炎、鼻竇炎、下呼吸道感染、便秘、腹瀉
健保類別	健保限制符合成人呼吸道疾患吸入製劑給付規定表
健保價	1244 元
藥品儲存	<30°C 避光儲存，自藥盒取出之後，最多保存 6 週

藥品外觀	 The image shows the packaging and the inhaler device for ANORO LIPITOR 55/22. The box is white with red and black text. It features the product name 'ANORO LIPITOR 55/22' in English and Chinese, along with the Chinese name '安肺樂易利達 55/22 mg 乾粉吸入劑'. The inhaler device is white with a red cap and a red mouthpiece. The device has a counter window showing the number of doses remaining.
系統管控	每月1瓶，不可與其他長效吸入劑併用。