

Artiss solution for sealant

藥品學名	Sealer protein 溶液+ Thrombin 溶液
商品名	英文：Artiss solution for sealant，中文：愛締絲低溫冷凍密合劑
劑型含量	共 2 ml · Sealer protein · 每 ml: human fibrinogen 72 – 110 mg/mL, aprotinin 2250 – 3750 KIU/ml Thrombin · 每 ml: human thrombin 3.2 – 5.0 IU/ml , calcium chloride 36-44 mcg/ml ·
廠牌	百特
許可證字號	衛署菌疫輸字第 000902 號
藥理作用	混合人體蛋白粘合劑和人體凝血酶的過程中，此兩個成分模擬血液凝固一系列機轉的最後階段，可溶性纖維蛋白原轉化成纖維蛋白，用以粘合創面和皮瓣或移植皮膚
適應症	1.用於將自體移植皮膚粘合在經外科處理過的燒燙傷創面，用於成人和兒童病人 2.臉部整形之除皺(facial rhytidectomy 又稱 face-lift)手術過程中的組織皮瓣粘合 3.不可作止血用途
用法用量	僅供體表局部使用。依據欲覆蓋的表面大小個別選擇用量。 2 mL 將覆蓋約 100 cm ² 的表面積
肝腎功能劑量調整	無
懷孕分級	C 級
藥物動力學	局部用藥無相關研究
禁忌	1.血管內使用為禁忌。 切勿直接將 Artiss 注射進入血管，否則可能造成致命的血栓栓塞情形。 2.不可用於已知對aprotinin過敏患者。
注意事項	1.酒精、碘或重金屬離子溶液 (如：消毒液) 都可使蛋白粘合劑和凝血溶液變質。若使用這些溶液處理創面，則必須在投予 Artiss 前將傷口沖洗乾淨，並盡可能使創面乾燥。 2.塗上薄薄一層 Artiss。凝塊厚度過大，可能會延遲傷口自然癒合的過程。 3.僅供體表局部使用，不可注射。只可使用在處理過的創傷表面。 4.本品為澄清透明或略帶乳白色，若溶液混濁或沉澱請勿使用。
交互作用	無
G6PD/青光眼	無
注意事項	
副作用	燒燙傷：植皮失敗，血腫和皮膚搔癢。 面部除皺：血腫/血清腫。
健保類別	自費
藥品儲存	長期：請保存在-20°C 以下的環境。

	<p>短期：室溫解凍：未開封的包裝袋在室溫下解凍後，可在室溫環境(15 – 25°C)最多保存 14 天。</p> <p>快速解凍：一直到使用前，產品須維持在 33 – 37°C 之間。若產品已從原包裝袋中取出，或已加熱至 33 – 37°C，則必須 12 個小時內使用。</p>
藥品外觀	 <p>The image shows the packaging for ARTISS 2 ml syringes. On the left is a white paper sleeve containing a syringe. On the right is a white box with blue and green accents, labeled 'ARTISS 2 ml' and 'Baxter'. Below the box is a clear plastic bag containing a syringe and other components. The Chinese text on the box includes '百特' and '愛締絲'.</p>
系統管控	自費使用。