

Asunaprevir + Daclatasvir

商 品 名	英文：Sunvepra + Daklinza，中文：速威干+坦克干
劑 型 含 量	100 mg/Cap +60 mg/tab
廠 牌	必治妥
許 可 證 字 號	衛署藥輸字第 026660+026662 號
藥 理 作 用	Asunaprevir、Daclatasvir 都是對抗 C 型肝炎病毒的直接作用型抗病毒劑。Asunaprevir 是 HCV NS3/4A 絲胺酸蛋白酶複合體的抑制劑。此 NS3/4A 酵素複合體的作用是將 HCV 的多蛋白加工成病毒複製所需要的成熟病毒蛋白質。Daclatasvir 是 NS5A 的抑制劑，NS5A 是一種多功能蛋白質，也是 HCV 複製複合體的必要組成。
適 應 症	治療代償性肝病(包括肝硬化)成人慢性 C 型肝炎基因型第 1b 型之感染。
用 法 用 量	Asunaprevir 100 mg bid+ daclatasvir 60 mg qd
肝 腎 功 能 劑 量 調 整	Asunaprevir 中重度肝功能不佳禁用，Ccr < 30 ml/min 100 mg qd。HD:100mg bid Daclatasvir 中重度肝功能不全不建議使用，腎功能不佳不需調整劑量。
懷 孕 分 級	禁用
藥 物 動 力 學	吸收：生體可用率 asunaprevir 9.3%，daclatasvir 67 % 分布：蛋白質結合率 asunaprevir 99%，daclatasvir 99 % 代謝： asunaprevir 肝 CYP3A，daclatasvir CYP3A4 排泄： asunaprevir 腎臟<1%、糞便 84%，daclatasvir 腎臟 6.6%、糞便 88% 半衰期： asunaprevir 17-23hr，daclatasvir 12-15hr
禁 忌	嚴重肝腎功能不全、懷孕
注 意 事 項	1. 腎功能不全應調整 Asunaprevir 用法用量。 2. 下列患者慎用：肝腎功能不全、授乳婦。 3. 藥物交互作用：Asunaprevir :propafenone、strong and moderate CYP 3A4 抑制劑、strong and moderate CYP3A4 誘導劑、rifampicin。Daclatasvir : Amiodarone、strong CYP3A4 抑制劑、strong CYP3A4 inducer、strong P-glycoprotein 抑制劑、rifampicin、rifapentin、dexamethasone。 4. 使用 Asunaprevir 過程需定期監測 ALT、AST、總膽紅素
副 作 用	頭痛、疲倦、胃腸不適、鼻咽炎、噁心
健 保 類 別	健保規範藥品
健 保 規 範	詳見附件
藥 品 儲 存	30°C 以下
藥 品 外 觀	 

