

Atorvastatin

商 品 名	英文:lipitor 中文:立普妥	
劑 型 含 量	10mg	
廠 牌	輝瑞	
許 可 證 字 號	衛署藥輸字第 022886 號	
藥 理 作 用	降血脂藥; HMG-CoA reductase inhibitor	
衛 生 署 核 可 適 應 症	高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症。	
用 法 用 量	10-80mg QD	
懷 孕 分 級	X 級	
藥 物 動 力 學	吸收：口服 14% 分布：蛋白質結合率 \geq 98% 代謝：肝 P450 CYP3A4 排泄：主要由膽汁排除 半衰期：14 小時	
禁 忌	活動性肝病、肝功能指數超過正常 3 倍、孕婦、授乳婦女。	
注 意 事 項	1. 服用本品患者宜先檢查肝功能，之後還得定期檢查。 2. 治療期間應小心監測是否出現肌肉疼痛、壓痛或肌肉無力之症狀。 3. 藥物交互作用：erythromycin、diltiazem、fenofibrate、itraconazole、ketoconazole、fluconazole、verapamil、amiodarone、erythromycin。	
副 作 用	胃腸不適、肝毒性、頭痛、肌痛、皮疹。	
健 保 類 別	健保給付藥品	
健 保 規 定	-	
健 保 價	28.9 元	
藥 品 儲 存	儲存於 20-25°C 以下	
藥 品 外 觀		
	橢圓形白色錠劑	有 PD155、10 字樣