

Atripla : Efavirenz+Emtricitabine+Tenofovir DF

藥品學名	Efavirenz+Emtricitabine+Tenofovir DF
商品名	英文：Atripla · 中文：舒發錠
劑型含量	每錠含：Efavirenz 600 mg+Emtricitabine 200 mg+Tenofovir DF 300 mg
廠牌	Patheon Inc.
許可證字號	衛部藥輸字第 025205 號
藥理作用	Efavirenz：NNRTI (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor) Emtricitabine：NRTI (nucleoside reverse transcriptase inhibitor) Tenofovir DF：NRTI (nucleoside reverse transcriptase inhibitor)
適應症	適合單獨使用或者與其他抗反轉錄病毒藥物合併使用，用於治療成人 HIV-1 感染。
用法用量	1 tab HS AC
肝腎功能劑量調整	肝：Child B-C 不建議使用 腎：Ccr<50 ml/min 不可使用
懷孕分級	D
藥物動力學	吸收：生體可用率 Efavirenz 無數據；Emtricitabine 93%；Tenofovir DF 25% 分布：蛋白結合率 Efavirenz 99.5%；Emtricitabine <4%；Tenofovir DF <0.7% 代謝：Efavirenz CYP3A/CYP2B6；Emtricitabine 未明顯；Tenofovir DF 肝 幾乎沒有 排除：Efavirenz 腎 14-34%；Emtricitabine 腎 70%；Tenofovir DF 腎 70-80% 半衰期：Efavirenz 52-76 h；Emtricitabine 10 h；Tenofovir DF 17 h
禁忌	對本品成分過敏、禁與voriconazole併用。
注意事項	1.下列患者慎用：Torsade de pointes 高風險族群、併服酒精及精神作用藥物、肝/腎功能不全、癲癇/骨折/骨質疏鬆症病史。 2.在開始治療前，應檢測是否患有慢性 B 型肝炎病毒感染。 3.接受治療婦女應避免懷孕/哺乳。 4.小於 18 歲病人不建議使用。 5.藥物交互作用：clarithromycin、nifedipine、linagliptin、fentanyl、rifampin、tramadol、dexamethasone、warfarin、QT-prolonging agents、NSAIDs、gingko biloba。
副作用	腹瀉、噁心、疲倦、鼻竇炎、上呼吸道感染、頭痛、抑鬱、皮疹、夢異常。
健保類別	健保限制藥品：依抗人類免疫缺乏病毒藥品使用規範
健保價	430 元/錠
藥品儲存	<30°C以下
藥品外觀	