

## 異動原因：更換廠商

|           |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 成 分 名     | <b>Butyl-Scopolamine</b>                                                          |                                                                                     |
| 含 量 / 劑 型 | <b>10 mg/tab</b>                                                                  |                                                                                     |
| 品 項       | 新 品                                                                               | 舊 品                                                                                 |
| 藥 品 外 觀   |  |  |
| 商 品 名     | <b>Lihosin</b>                                                                    | <b>Butyscol</b>                                                                     |
| 中 文 名     | 立好痙                                                                               | 普治使可                                                                                |
| 廠 牌       | 中化                                                                                | 生達                                                                                  |
| 健 保 碼     | <b>AC395611G0</b>                                                                 | <b>NC00979100</b>                                                                   |
| 許 可 證 字 號 | 衛署藥製字第 039561 號                                                                   | 內衛藥製字第 000979 號                                                                     |
| 適 應 症     | 胃腸道痙攣、生殖泌尿道痙攣、月經困難                                                                |                                                                                     |
| 用 法 用 量   | 1~2# 每天 3~5 次                                                                     |                                                                                     |
| 副 作 用     | 心跳過速、口乾、尿滯留                                                                       |                                                                                     |