

Cerebrolysin

商 品 名	英文：Cerebrolysin，中文：速利清
劑 型 含 量	18 種氨基酸 215.2 mg/10 ml/Amp
廠 牌	EVER neuro pharma
許 可 證 字 號	衛署藥輸字第 018737 號
藥 理 作 用	胺基酸溶液，主要為提供氮來源以合成蛋白質
適 應 症	不能攝取適當食物之患者之補助治療劑，蛋白質之消化吸收機能及合成利用障礙，嚴重創傷、火傷、骨折時蛋白質之補給，蛋白質攝取減少營養失調症。
用 法 用 量	治療初期每天 2 ml IV or SC，然後治療間隔加長至兩或三天。較輕的症狀每一治療過程需 10~15 針，較重的症狀則視需要可加長至數個治療過程。高劑量：每天 5-40 ml slow IV push or IVD。根據病況每一治療過程 10 至 15 針，如需要可連續數個治療過程。
肝 腎 功 能 劑 量 調 整	嚴重腎功能不全：禁用
懷 孕 分 級	無資料
藥 物 動 力 學	無資料
禁 忌	嚴重腎功能不全
注 意 事 項	注射速度太快時，會有輕微灼熱感，極少有惡寒或體溫上升之過敏反應。
副 作 用	灼熱感、體溫上升
健 保 類 別	自費
自 費 價	750 元
藥 品 儲 存	25℃以下
藥 品 外 觀	