

## Chlorpromazine

藥品學名	Chlorpromazine
商品名	英文：Morefine，中文：莫煩
劑型含量	100 mg/tab
廠牌	榮民
許可證字號	衛署藥製字第 041547 號
藥理作用	Phenothiazine 抗精神病藥物：具鎮靜和止吐作用，作用機轉不明
適應症	躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙
用法用量	躁病：住院病患起始劑量 25 mg tid，有效劑量 400 mg/day；門診病患 25 mg bid-tid 精神病：住院病患 200-1600 mg/day，門診病患 50-400 mg/day
腎功能劑量調整	無
懷孕分級	無數據
藥物動力學	吸收：生體可用率 32% 分布：蛋白質結合率 90-99% 代謝：liver 排泄：renal (23%) 半衰期：6 hr
禁忌	昏迷狀態、併用大劑量 CNS 抑制劑 (如 barbiturates, alcohol, narcotics)、對 phenothiazines 過敏
注意事項	1. 下列患者不宜使用：骨髓抑制、雷氏症兒童 2. 下列患者慎用：暴露於極熱環境、使用有機磷殺蟲劑、癲癇、心血管疾病、腎疾、肝疾、肝性腦病變、青光眼、骨髓攝影 3. 必須停藥時，需分階段性減量。 4. 口服後一小時內，不可服用制酸劑或瀉劑。 5. 藥物交互作用：antipsychotics、fluoroquinolones、macrolides、fluconazole、cotrimoxazole、voriconazole、prochlorperazine、citalopram、TCA、droperidol、haloperidol、amiodarone、class I antiarrhythmics、octreotide、vasopressin、isoflurane、metoclopramide、domeperidone、solifenacin、narcotics、meclizine、zolpidem、tramadol、tranexamic acid
副作用	尿液變色、昏睡、暈眩、心跳過速、姿勢性低血壓、血液毒性(如白血球減少)、encephlopathic syndrome、體溫調節異常、便秘、噁心、口乾、肝功能障礙、NMS、帕金森氏症、遲發性運動困難、呼吸道障礙、水晶體/角膜微粒子沉積、prolactin 升高、過敏
健保類別	健保給付藥品
健保規定	無
健保價	1.96 元
藥品儲存	15-30°C 乾燥避光
藥品辨識	