

Cinacalcet

藥品學名	Cinacalcet
商品名	英文：Regpara，中文：銳克鈣
劑型含量	25 mg/tab
廠牌	Ohara (協和發酵麒麟股份有限公司)
許可證字號	衛署藥輸字第 025141 號
藥理作用	擬鈣製劑：經由增加鈣感受性受體對於細胞外鈣的敏感性而直接降低 PTH 的濃度。
適應症	透析患者的次發性副甲狀腺機能亢進
用法用量	25 mg qd，每 2-4 週依 iPTH 目標值及血鈣值調整劑量，每次增加 25 mg，可達 100mg qd
肝腎功能劑量調整	中度及重度肝功能不全者使用時須小心監測 PTH 及血鈣濃度
懷孕分級	C
藥物動力學	吸收：無資料 分布：蛋白結合率 93-97 % 代謝：肝 排泄：腎 80%，糞便 15% 半衰期：30-40h
禁忌	血鈣低於正常值
注意事項	1. 下列患者慎用：心臟功能不全、肝功能不全患者。 2. 可單獨使用或併用維他命 D 或磷結合劑。 3. 中至重度肝功能不全患者應監測 iPTH、血鈣、血磷。 4. 須整粒吞服，不可剝半或磨粉。
副作用	胃腸不適、低血鈣、頭暈、高/低血壓、心衰竭惡化、心律不整、胸痛、無力、肌痛、過敏
健保類別	自費
自費價	220 元
藥品儲存	<25℃ 以下
藥品外觀	

