

# 藥物安全簡訊

日期	108.06
成分	Clarithromycin
訊息緣由	食品藥物管理署再次提醒併用Clarithromycin 和Domperidone可能會因藥物交互作用導致QT區間延長引起致命性心律不整。
公告事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Clarithromycin為強力肝臟酵素CYP<sub>3</sub>A<sub>4</sub>抑制劑，與 Domperidone併用會增加後者之血中濃度，且因兩者皆會導致QT區間延長，併用時可能會引起致命性心律不整，故不可同時使用。</li><li>2. 不應處方含Clarithromycin或Domperidone成分藥品於有QT延長或心室心律不整病史者。</li><li>3. 使用Clarithromycin應確認病人是否正在使用其他經由CYP<sub>3</sub>A代謝或可能造成QT延長之藥品，因可能增加發生不良反應的風險。</li><li>4. 應告知病人心律異常相關症狀及徵兆並提醒病人服藥期間若出現任何心臟不適症狀，應儘速回診就醫。</li></ol>
資料來源	全國藥物不良反應通報中心： <b>Clarithromycin 成分藥品安全資訊風險溝通表</b> <a href="https://adr.fda.gov.tw/Manager/Pages/PB010009.aspx?20190611112132147508E5282A6A4332">https://adr.fda.gov.tw/Manager/Pages/PB010009.aspx?20190611112132147508E5282A6A4332</a>