

Naltrexone/bupropion

藥品學名	Naltrexone/bupropion																
商品名	英文：Contrave Extended-Release Tablets · 中文：康纖芙持續性釋放錠																
劑型含量	Naltrexone 8mg/bupropion 90mg																
廠牌	加拿大 Petheon																
許可證字號	衛部藥輸字第 028220 號																
藥理作用	naltrexone 和 bupropion 對於兩個涉及食物攝取的不同腦內區域，包含下視丘(食慾調節中樞)和中腦邊緣多巴胺迴路(獎勵系統)能加以調控。																
適應症	用於體重控制，做為低熱量飲食及增加體能活動外之輔助療法，適用對象為成人病人且初始身體質量指數(BMI)為： <ul style="list-style-type: none"> • $\geq 30 \text{ Kg/m}^2$ · 或 • $\geq 27 \text{ Kg/m}^2$ 至 $< 30 \text{ Kg/m}^2$ · 且病人至少有一項體重相關共病症，例如第二型糖尿病、血脂異常或已獲控制之高血壓。 																
用法用量	劑量根據以下時程調升 <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>晨間劑量</th> <th>夜間劑量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第 1 週</td> <td>1#</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>第 2 週</td> <td>1#</td> <td>1#</td> </tr> <tr> <td>第 3 週</td> <td>2#</td> <td>1#</td> </tr> <tr> <td>第 4 週</td> <td>2#</td> <td>2#</td> </tr> </tbody> </table> <p>在第 4 週起達到 2 tab BID 每日總劑量 32mg/360mg。</p>			晨間劑量	夜間劑量	第 1 週	1#	無	第 2 週	1#	1#	第 3 週	2#	1#	第 4 週	2#	2#
	晨間劑量	夜間劑量															
第 1 週	1#	無															
第 2 週	1#	1#															
第 3 週	2#	1#															
第 4 週	2#	2#															
肝腎功能劑量調整	腎功能不全：每日最大劑量 2#(早晚各 1#)。不建議用於末期腎病病人。 肝功能不全：不建議用於中度肝功能不全病人且禁用於重度肝功能不全病人																
懷孕分級	D																
藥物動力學	吸收：Naltrexone：無資料; Bupropion：無資料 分布：Protein binding Naltrexone：21 %; Bupropion：84 % 代謝：Naltrexone：腎代謝; Bupropion：substrate of CYP2B6 排除：Naltrexone：腎排除 53-79 %; Bupropion：腎排除 87 % 半衰期：Naltrexone 5 hrs ; Bupropion 21 hrs																
禁忌	罹患未受控制的高血壓、癲癇病史、中樞神經系統腫瘤、使用其他含bupropion或含naltrexone的藥品、躁鬱症病史、暴食症或心因性厭食症、長期使用類鴉片之促效劑、目前突然停用酒精、BZD類藥物、barbiturate類藥物及抗癲癇藥物、同時施用單胺氧化酶抑制劑、重度肝功能不全																
注意事項	1. 下列患者慎用：心血管疾病、肝腎功能不全、躁鬱症、T2DM、老人。 2. 維持劑量治療 12 週後，如果病人未減輕基期體重的至少 5%，請停用。																

	3. 不應搭配高脂餐點服用。 4. 錠劑不可剝半、咀嚼或磨粉。
交互作用	opioids、linezolid、clopidogrel、naloxone、nalbuphine、dinalbuphine、venlafaxine、madopar、amantadine、risperidone、metoclopramide、neбивolol、donepezil、methimazole、trazodone
G6PD/青光眼	可能誘發隅角閉鎖青光眼發作
副作用	便秘、腹瀉、噁心、嘔吐、焦慮、口乾、頭暈、頭痛、失眠、自殺想法和行為
健保類別	自費藥品
藥品儲存	25°C 以下儲存
系統管控	自費使用
藥品外觀	