

Dabigatran

藥品學名	Dabigatran
商品名	英文：Pradaxa，中文：普栓達
劑型含量	150 mg/cap
廠牌	百靈佳
許可證字號	衛署藥輸字第 025458 號
藥理作用	Dabigatran 和 acyl glucuronides 代謝物會抑制 thrombin 產生，可預防血栓產生。
適應症	預防非瓣膜性心房纖維顫動病患發生中風與全身性栓塞
用法用量	150 mg BID
肝腎功能劑量調整	Ccr ≥ 50 ml/min：150 mg BID，Ccr 30-50 ml/min：110 mg BID，Ccr < 30 ml/min 不建議使用；活動性肝臟疾病不建議使用。
懷孕分級	C 級
藥物動力學	吸收：生體可用率 3-7% 分布：蛋白質結合率 35% 代謝：血漿、肝臟酯酶水解 排泄：腎臟 80% 半衰期：12-17 hr
禁忌	活動性病理性出血、機械人工瓣膜患者
注意事項	1. 下列患者慎用：心臟瓣膜疾病、老人、腎功能不全、合併腦/脊髓手術/外科手術、陣痛或分娩。 2. 藥物交互作用：clarithromycin、verapamil、fenofibrate、p-glycoprotein inhibitor/inducer、anticoagulants、antiplatelet、NSAID。 3. 整粒吞服，不可磨粉或咀嚼。 4. 侵入性檢查或手術前須停用(Ccr ≥ 50 mL/min 1-2天、Ccr < 50 mL/min 3-5天)，接受重大手術、脊椎穿刺，應考慮延長時間。 5. 出血監測抗凝血效果，建議使用aPTT(出血風險:>2倍正常值或>80秒)，不建議監測INR。
副作用	出血、胃腸道不適
健保類別	健保限制藥品
健保規定	1.限用於非瓣膜性心房纖維顫動病患，且須符合下列條件之一： (1)曾發生中風或全身性栓塞。(2)左心室射出分率小於 40%。 (3)有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能為第二級或以上。(4)年齡 75 歲以上。 (5)年齡介於 65 歲至 74 歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。 2.排除標準：(1)病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。(2)14 天內發生中風。 (3)收案前的 6 個月內發生嚴重中風。(4)有增加出血風險的情況。 (5)肌酸酐清除率小於 30 mL/min。(6)活動性肝病和懷孕。
健保價	49.6 元
藥品儲存	30°C 以下
外觀	