

Dapoxetine

藥品學名	Dapoxetine
商品名	英文：Priligy，中文：必利勁
劑型含量	30 mg/tab
廠牌	Janssen
許可證字號	衛署藥製字第 025417 號
藥理作用	選擇性血清素再利用抑制劑(SSRI)：抑制神經元對 serotonin 的再吸收以及隨後發生在突觸前及突觸後接受體上神經傳導物質作用的效應。
適應症	18-64 歲且符合下列所有條件的早發性射精男性： 1.陰道內射精潛伏時間短於兩分鐘 2.難以控制射精，在性行為插入之前、當時或不久後經過輕微刺激，發生持續或復發性射精 3.因為早發性射精而導致病人明顯沮喪
用法用量	30 mg 在性行為之前約 1 至 3 小時視需要使用，建議服用頻率最多一天一次
肝腎功能劑量調整	重度腎功能異常、中/重度肝功能異常不建議使用
懷孕分級	缺乏資料(沒有用於女性的適應症)
藥物動力學	吸收：生體可用率 42% 分布：蛋白質結合率 >99% 代謝：肝臟及腎臟(CYP2D6、CYP3A4、flavin monooxygenase) 排泄：尿液 半衰期：19hr
禁忌	重度腎功能異常、中/重度肝功能異常、併用 thioridazine/MAOI/SSRI/SNRI/TCA/tramadol/強效 CYP3A4 / CYP2D6 抑制劑、NYHA 2~4 級 CHF、心臟傳導異常且未以永久性心律調整器治療、顯著缺血性心臟病/心瓣膜疾病
注意事項	1. 下列患者慎用：輕/中度腎功能異常、癲癇、併用抗血小板藥物/PDE5 抑制劑/ α antagonist、出血/凝血病變病史 2. 藥物交互作用：duloxetine、paroxetine、venlafaxine、imipramine、trazodone、tramadol、terbinafine、ketoconazole 3. 錠劑應整顆吞服以防苦味，且須併服一杯水。 4. 服藥時避免飲酒、避免開車或操作危險器具。 5. 18 歲以下、65 歲以上不可使用。
副作用	頭痛、頭暈、噁心、失眠、疲倦、視力模糊、耳鳴、胃腸不適、姿勢性低血壓、勃起功能障礙
健保類別	健保不給付藥品
健保規定	無
健保價	自費價 1000 元(3 顆/盒)
藥品儲存	25°C 以下
總結	1. 院內現無類似藥品，泌尿科於 103 年 5 月臨採。 2. 限泌尿科使用
藥品外觀	