

Darbepoetin

藥品學名	Darbepoetin alfa
商品名	英文：NESP，中文：耐血比
劑型含量	20 mcg/1ml/Vial；40 mcg/1ml/Vial
廠牌	Taiyo
許可證字號	衛署菌疫輸字第 000882；000884 號
藥理作用	刺激紅血球生成
適應症	治療與慢性腎臟功能失調有關的貧血症狀或因此而需要輸血的患者，治療與癌症化學治療有關的症狀性貧血。
用法用量	起始劑量：0.45 mcg/kg QW IV/SC 維持劑量：維持 Hb 10~12 g/dl 二週內 Hb 上升 > 1 g/dl，減量 25% 原始劑量 四週後 Hb 上升 < 1 g/dl，增量 25% 原始劑量，而後每 4 週調整劑量
腎功能劑量調整	無
懷孕分級	C 級
藥物動力學	吸收：生體可用率 37% 半衰期：46 hrs (dialysis)；70 hrs
禁忌	1. 對本品過敏 2. 未控制之高血壓 3. 曾使用紅血球生成素產生單純紅血球發育不全者
注意事項	1. 下列患者慎用：心血管疾病、高血壓、癲癇、慢性腎衰竭、孕婦、授乳婦 2. 鐵質缺乏、感染、發炎或出血情形，可能影響血紅素生成反應 3. 癌症患者可能增加死亡或腫瘤惡化或復發風險 4. 兩週內 Hb 增加速度 > 1 g/dl，會增加心血管疾病死亡之風險 5. 監測 Hct/Hb、血壓、iron status 6. 血液透析者對 heparin 之須求可能增加，以避免透析系統阻塞
副作用	水腫、週邊水腫、高血壓、低血壓、頭痛、腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐、肌肉痛、感染、呼吸困難
健保類別	健保限制藥品
健保規定	詳見 EPO 健保給付規定
健保價	1030/1587 元
藥品儲存	儲存於冷藏 2~8°C, 需避光

藥品辨識

