

Docetaxel

藥品學名	Docetaxel
商品名	Taxotere, 剋癌易
劑型含量	80 mg/2 ml/vial, 20 mg/0.5 ml/vial
廠牌	賽諾菲
許可證字號	衛署藥輸字第 022048 號
藥理作用	Paclitaxel 類似物：使微小管次體結合成微小管，穩定微小管並抑制微小管分離
適應症	乳癌、非小細胞癌、前列腺癌、胃腺癌、頭頸癌
用法用量	乳癌：手術可切除時，75 mg/m ² /dose，共 6 個療程 局部晚期或轉移性乳癌，單方治療 60~100 mg/m ² /dose，每 3 個禮拜一次
懷孕分級	D 級
藥物動力學	吸收：生體可用率 8% +/- 6% 分布：蛋白質結合率 94%~97% 代謝：肝 排泄：腎(6%) 半衰期：11.1 小時
禁忌	嗜中性白血球 < 1500 cell/mm ³ 、孕婦、哺乳婦
注意事項	1. 下列患者慎用：肝功能異常、老年人、體液滯留者、併用 cyclophosphamide、併用 cisplatin 和 fluorouracil、非小細胞肺癌服用過鉑 2. 藥物交互作用：Fluconazole、Itraconazole、Ketoconazole、麻疹疫苗、腮腺炎疫苗、德國麻疹疫苗、小兒麻痺疫苗、水痘疫苗 3. 劑量 > 100 mg/m ² ，會增加死亡率的發生，特別是轉移性的乳癌患者
副作用	水腫、禿頭、腹瀉、噁心、嘔吐、口腔發炎、貧血、嗜中性白血球減少、無月經
健保類別	健保限制藥品
健保規定	乳癌： (1) 局部晚期或轉移性乳癌。 (2) 與 Anthracycline 合併使用於腋下淋巴結轉移之早期乳癌且動情素受體為陰性之術後輔助性化學治療。
健保價	80 mg：20376 元，20 mg：5416 元
藥品儲存	儲存溫度不可高於 25°C 或低於 2°C