

Dufanas Nasal Spray

藥 品 學 名	Azelastine hydrochloride / fluticasone propionate
商 品 名	英文：Dufanas，中文：帝伏寧鼻噴劑
劑 型 含 量	Azelastine hydrochloride 137 mcg / fluticasone propionate 50 mcg / 120 puff, 30 ml/bot
廠 牌	健喬信元
許 可 證 字 號	衛署藥製字第 060851 號
藥 理 作 用	Azelastine hydrochloride：組織胺 H ₁ 受體拮抗劑。 Fluticasone propionate：合成的 corticosteroid 具有抗發炎活性。
適 應 症	治療 6 歲以上兒童及成人之中度至重度過敏性鼻炎的相關症狀。
用 法 用 量	每次兩鼻孔各噴 1 下，每天使用二次(早上和晚上)。
肝 腎 功 能 劑 量	肝功能不全：NA。
調 整	腎功能不全：NA。
懷 孕 分 級	C
藥 物 動 力 學	吸收：Bioavailability, intranasal：Azelastine hydrochloride 40% / fluticasone propionate 44-61% 分布：Protein binding：Azelastine hydrochloride 88% / fluticasone propionate 99% 代謝：Azelastine hydrochloride 肝臟代謝/ fluticasone propionate CYP3A4 排除：approximately Azelastine hydrochloride 75% / fluticasone propionate 95% 由糞便排除 半衰期：Azelastine hydrochloride 22hr / fluticasone propionate 7.2hr
禁 忌	對成份或賦形劑過敏。
注 意 事 項	1. 下列病人慎用：兒童、肝功能不全、創傷、術後、感染(水痘或麻疹病史，結核，嚴重細菌、真菌、病毒及寄生蟲，單純疱疹)、白內障、青光眼。 2. 有嗜睡副作用，避免與酒精、中樞神經抑制劑併用，操作機械或駕駛須小心。 3. 首次使用需先空噴 6 下或直至出現均勻細霧再開始使用。當 14 天以上未使用，需空噴 1 下或直到出現均勻細霧再使用。 4. 避免噴到眼睛。如果噴到眼睛，用清水沖洗眼睛至少 10 分鐘。 5. 鼻內有傷口或出血應暫停使用，直至鼻內傷口癒合；使用後有過敏症狀亦需停用。
交 互 作 用	Azelastine：Donepezil、Hydroxychloroquine、Bupropion Fluticasone：Desmopressin、Ritonavir(Paxlovid)、Fluconazole、Phenytoin、Oxcarbamazepine、Aspirin、insulin aspart、Diane-35
G6PD/青 光 眼	Fluticasone：青光眼慎用
副 作 用	頭痛、嗜睡、味覺異常、噁心嘔吐、鼻腔喉嚨刺激疼痛發炎、流鼻血、鼻塞流鼻水、咳嗽、中耳炎、上呼吸道感染、免疫抑制、念珠菌感染、骨質疏鬆。
健 保 類 別	健保給付藥品。
健 保 價	150 元

藥品儲存	<25℃以下
系統管控	無
藥品外觀	