

Duodart

藥 品 學 名	Dutasteride 0.5 mg/tamsulosin 0.4 mg /cap
商 品 名	英文：Duodart，中文：多適達
廠 牌	葛蘭素史克
許 可 證 字 號	衛署藥輸字第 025423 號
藥 理 作 用	Dutasteride：是一種 5α-reductase 抑制劑，可阻止睪固酮轉化成 DHT (5α-dihydrotestosterone)。DHT 為一種雄性激素，主要負責攝護腺的初期發育與後續的增殖。 Tamsulosin：α_{1A} 腎上腺素受體拮抗劑，使攝護腺、尿道及膀胱平滑肌鬆弛，改善尿流速率並減輕良性攝護腺肥大症的症狀。
適 應 症	具有症狀且攝護腺增大之攝護腺肥大症的第二線治療。
用 法 用 量	1cap QD。
肝腎功能劑量調整	肝功能不全：NA。 腎功能不全：NA。
懷 孕 分 級	X
藥 物 動 力 學	吸收：Bioavailability：Dutasteride 60%；tamsulosin greater than 90% 分布：Protein binding：Dutasteride 99%；tamsulosin 94-99% 代謝：Dutasteride CYP3A4 代謝；tamsulosin CYP3A4、CYP2D6 代謝 排除：Dutasteride 糞便 45%；tamsulosin 腎臟 76%、糞便 21% 半衰期：Dutasteride 5weeks；tamsulosin 9-15 hours
禁 忌	孕婦、具生育能力的婦女、兒童。
注 意 事 項	1. 下列病人慎用：使用後攝護腺特定抗原 (PSA) 上升、近期準備接受白內障或青光眼手術。 2. 停藥後六個月內不建議捐血，受贈者有可能為孕婦，而 Dutasteride 對胎兒具潛在風險。 3. 服用期間應定期監測 PSA。 4. 可經由皮膚吸收進入體內，懷孕或可能懷孕的婦女不可觸摸。 5. 具黏膜刺激性，需整粒吞服，不可咀嚼或打開膠囊。
交 互 作 用	Tadalafil、Sildenafil、Venlafaxine、Escitalopram、Sertraline、Paroxetine、Celecoxib、Ritonavir(Paxlovid)、Phenytoin、Oxcarbamazepine、Doxazosin、Silodosin、Terazosin
G6PD/青光眼	Tamsulosin：G6PD/青光眼慎用
副 作 用	陽萎、性慾降低、乳房疾患(包括乳房增大及壓痛)、射精障礙、頭暈、姿勢性低血壓、感染、頭痛背痛、疲倦、失眠、嗜睡、流鼻水。
健 保 類 別	健保限制藥品。 限前列腺增生且有阻塞症狀，經直腸超音波前列腺掃描(TRUS of prostate)或使用腹

	部超音波測量(僅限無法實施直腸超音波前列腺掃描者)為原則，前列腺大於 30mL 或最大尿流速(Qmax)小於 15mL/sec 之病人。
健 保 價	27.7 元
藥 品 儲 存	<25°C以下
	