

Chlorhexidine Gluconate 2%

藥 品 學 名	Chlorhexidine Gluconate
商 品 名	英文：Easy Antiseptic Cleansing Solution 2% · 中文：克菌寧殺菌潔淨液 2%
劑 型 含 量	30 mL/tube
廠 牌	寶齡富錦
許 可 證 字 號	衛署藥製字第 057984 號
藥 理 作 用	帶陽離子基團會結合細菌細胞陰離子，改變微生物細胞的滲透平衡，使微生物之細胞質內鉀、磷外漏而達殺菌作用。
適 應 症	手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。
用 法 用 量	抗菌洗手用 - 倒出 5 毫升於濕潤的手上，搓揉 30 秒，沖洗乾淨，待乾燥。 身體或淋浴使用 - 塗揉於濕潤的身體上，擦洗如平常洗澡般，沖洗乾淨，待乾燥。
肝 腎 功 能 劑 量 調 整	不需調整劑量
懷 孕 分 級	Fetal risk cannot be ruled out (B)
藥 物 動 力 學	吸收：Little or no absorption 分布：無數據 代謝：無數據 排除：腎 10%，糞便 90% 半衰期：無數據
禁 忌	二個月以下新生兒。
注 意 事 項	1. 下列患者慎用：兒童、孕婦、授乳婦、深部組織感染。 2. 避免陽光直射。 3. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。 4. 本製劑限於皮膚外用，不使用於臉部、眼睛四周、黏膜、傷口。 5. 使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。 6. 避免接觸外耳道，尤其耳膜破裂時進入中耳，有造成耳聾之虞。 7. 需單次使用完畢，勿加水稀釋避免影響效果，建議配合使用新開封的沐浴海綿與毛巾。
副 作 用	刺激感、皮膚炎、過敏性反應。
健 保 類 別	自費藥品
藥 品 儲 存	<25°C 以下
總 結	