

藥物安全簡訊

日期	109.07
成分	Direct-acting oral anticoagulants(DOACs) 院內品項：edoxaban 30mg/tab、60mg/tab
訊息緣由	2020/6/29英國醫藥品管理局(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA)發布使用DOACs類藥品期間應對出血相關併發症之徵兆及症狀保持警覺，尤其對於有較高出血風險的病人。
公告事項	<ol style="list-style-type: none">1. 針對可能增加出血風險的病人(例如：老年人、體重低或腎功能不全之病人)應謹慎使用DOACs類藥品。應讓病人注意到此類藥品的出血風險，並例行性在臨床上檢查病人是否有出血或貧血徵兆。使用DOACs類藥品治療期間任何部位均可能出血，若發生嚴重出血應停止用藥。2. DOACs類藥品會與某些藥品產生交互作用，有些會增加出血風險。DOACs類藥品不應與其他抗凝血劑併用。P-glycoprotein或CYP3A4(或其兩者)的強效抑制劑會增加DOACs類藥品之血中濃度，因此不建議併用或可能須降低DOACs類藥品之劑量。3. 評估病人腎功能時宜使用肌酸酐清除率(CrCl)計算，以處方適當劑量；若使用估算腎絲球過濾率(eGFR)則可能高估病人腎功能而增加出血事件的風險。若病人於治療期間腎功能出現顯著變化，則可能須調整DOACs類藥品之劑量。
資料來源	全國藥物不良反應通報中心： 直接作用型口服抗凝血劑成分藥品安全資訊風險溝通表 https://adr.fda.gov.tw/Manager/Pages/PB010009.aspx?2020072414120715C974CD3CB6804D10